

Aumentó práctica de mamografía de mujeres entre los 40 a 69 años

- *El nivel de conocimiento y práctica de la citología es mayor entre las mujeres del régimen contributivo frente a las del subsidiado.*
- *Las mujeres de zonas rurales y con menor nivel educativo lideran el grupo de quienes nunca se han hecho la citología.*
- *El 87,6 % de los hombres de 50 a 59 años conoce el tacto rectal, pero solo el 34,6 % se lo ha realizado.*
- *El cáncer de próstata ocupa el primer lugar en incidencia por cáncer en la población masculina.*

Bogotá (D.C.), 12 de diciembre de 2016.- El cáncer es un problema de salud pública dada su magnitud, impacto económico y social. En Colombia, los tipos de cáncer que se diagnostican con frecuencia entre las mujeres son de mama, de cuello uterino, colon, recto, estómago y tiroides; en los hombres, los principales tipos de cáncer son de próstata, estómago, pulmón, colon y recto.

De acuerdo con lo anterior, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015 indagó sobre el conocimiento de los colombianos en torno a este tema, la periodicidad en la toma de exámenes y acceso a los servicios de salud.

Citología cervicouterina

La ENDS 2015 revela que si bien el examen de la citología se considera de conocimiento universal entre las mujeres de 13 a 49 años, el quintil de riqueza, la zona de residencia y el nivel educativo siguen consolidándose como una barrera a la hora de realizarse el examen.

De igual forma, se puso establecer que el 9,1 % de las mujeres en Colombia que se realizaron la citología reclamó el resultado; de este porcentaje el 3,8 % reportó que fue normal y 5,5 % reportó anomalías, específicamente entre las mujeres de edades de 21 a 24 años.

Por departamentos, la práctica de la citología es menor en Vaupés (64,0

%) y Guainía (77,1 %), con porcentajes menores al 80,0 %, seguidos de Chocó (81,0 %), Amazonas (84,5 %), Vichada (86,4 %), La Guajira (86,8 %) y Magdalena (87,6 %).

La falta de entrega de resultados por parte de las instituciones de salud se reporta en mayor proporción en el régimen subsidiado (21,9 %) frente al contributivo (15,1 %).

Virus del papiloma humano (VPH)

El cáncer de cuello uterino es causado por la infección persistente que causan los tipos de VPH que son transmitidos por vía sexual; en los últimos años los casos relacionados con el virus del papiloma humano (VPH) en las mujeres colombianas ha sido blanco de fuertes debates en torno a las causas, efectos y soluciones.

La ENDS 2015 encontró que el 90,3 % de la mujeres y el 81,5 % de los hombres entre 13 a 49 años conocen el VPH saben de los riesgos físicos y la vía de contagio; sin embargo, el conocimiento en torno al tema se hace menor en los afiliados al régimen subsidiado y en la zona rural.

Por otra parte el 40,4 % de las mujeres de 13 a 69 años conoce la pruebas que diagnostican el VPH; sin embargo, esta tendencia es visible en mujeres que pertenecen a un mayor nivel educativo y de quintil de riqueza alto.

Por departamentos el menor conocimiento se presenta en las regiones de Orinoquía y Amazonía, mientras que es mayor en Bogotá.

Detección temprana de cáncer de mama

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de seno cobra alrededor de 2.600 muertes en mujeres en Colombia. La ENDS 2015 logró identificar que el conocimiento y práctica del examen disminuyó en las mujeres que se ubican en la zona rural, así como en las regiones Atlántica, Orinoquía y Amazonía.

Así mismo, los departamentos con menor porcentaje de conocimiento del autoexamen de seno fueron Vaupés (43,8 %) Guainía (70,9 %) y Amazonas (75,1 %).