







Análisis de Situación de Salud Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2018

Dirección Local de Salud Municipio de El Dovio

RODOLFO VIDAL ASTAIZA

Alcalde Municipal, El Dovio Valle

Diana Milena Valencia Secretaria de Bienestar Social Dirección Local de Salud Municipio de El Dovio

El Dovio - Valle del Cauca, 2018

CONTENIDO

| PRESENTACIÓN | 12 |
|--|-----|
| INTRODUCCIÓN | 13 |
| METODOLOGÍA | 15 |
| AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES | 17 |
| SIGLAS | 18 |
| 1.CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO | 20 |
| 1.1.Contexto territorial | 20 |
| 1.1.1.Localización | 20 |
| 1.1.2.Características físicas del territorio | 22 |
| 1.1.3.Accesibilidad geográfica | 26 |
| 1.2.Contexto demográfico | 30 |
| 1.2.1.Estructura demográfica | 32 |
| 1.2.2.Dinámica demográfica | 38 |
| 1.2.3.Víctimas del Conflicto Armado | 39 |
| 2.CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES | 42 |
| 2.1.Análisis de la mortalidad | 42 |
| 2.1.1.Mortalidad general por grandes causas | 42 |
| 2.1.2.Mortalidad específica por subgrupo | 50 |
| 2.1.3.Mortalidad materno – infantil y en la niñez | 74 |
| 2.1.4.Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez | 95 |
| 2.1.5.Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general | 108 |
| 2.2.Análisis de la Morbilidad | 110 |
| 2.2.1.Principales causas de Morbilidad | 110 |
| 2.2.2.Morbilidad específica por subgrupo | 117 |
| 2.2.3.Morbilidad de Eventos de alto Costo | 119 |
| 2.2.4.Morbilidad de eventos Precursores | 121 |

| 2.2.5.Morbilidad de eventos de notificación obligatoria | 122 |
|--|-----|
| 2.2.6.Análisis de la población en condición de discapacidad 2017 | 122 |
| 2.2.7.Identificación de prioridades Principales en la Morbilidad | 126 |
| 2.2.8.Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS | 127 |
| 2.2.8.1.Análisis de los determinantes intermedios de la salud | 127 |
| 2.2.8.2.Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud | 133 |
| 3.CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD | 135 |
| 3.1.Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente | 135 |

LISTA DE TABLAS

| Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2013 2 |
|---|
| Tabla 2. Distribución de las veredas según su corregimiento |
| Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Dovio 2013 2 |
| Tabla 4. Tiempo y distancia entre municipio vecinos2 |
| Tabla 5. Sistema de comunicación vial entre el área urbana y rural del municipio de El Dovio 2 |
| Tabla 6. Población por área de residencia municipio de El Dovio 20183 |
| Tabla 7. Tipo de Vivienda existente |
| Tabla 8. Material predominante en las paredes |
| Tabla 9. Material predominante en los pisos |
| Tabla 10. Ubicación de los hogares del municipio de El Dovio, |
| Tabla 11. Población por pertenencia étnica del Municipio de El Dovio- Valle del Cauca, 2018 3 |
| Tabla 12. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio El Dovio. 2005, 2018 y 2020 3 |
| Tabla 13. Proporción de la población por grupo etario, del municipio (2005, 2018, 2020.)3 |
| Tabla 14. Otros Indicadores Demográficos. El Dovio |
| Tabla 15. Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento/ municipio, 2005, 2018, 2020 3 |
| Tabla 16. Comportamiento de la Tasa Especifica de Fecundidad en el municipio de El Dovio, 2005-2010 |
| Tabla 17. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio El Dovio, corte 19 Septiembre 2018 |
| Tabla 18. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Población General en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca4 |
| Tabla 19. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Hombres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca |
| Tabla 20. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Mujeres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca4 |
| Tabla 21. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Población General en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca4 |
| Tabla 22. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Hombres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca4 |
| Tabla 23. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Mujeres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca5 |
| Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipi de El Dovio |
| Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres y mujeres de municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |

| Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 201654 |
|---|
| Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de El Dovio, 2005 – 2016 55 |
| Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres y mujeres de El Dovio, 2005 – 2016 50 |
| Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 20166 |
| Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombre del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio 2005 – 2016 |
| Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 40. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 41. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Tabla 42. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 20167 |
| Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201672 |
| Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201672 |
| Tabla 45. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Dovio, 2006- 201673 |
| Tabla 46. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Dovio, 2006 201674 |
| Tabla 47. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |

| Tabla 48. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grande grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
|--|----------|
| Tabla 49. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grande grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 50. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según gr grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 51. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 100.000 nacidos vivos, según grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 52. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 100.000 nacidos vivos, según grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 53. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos, según grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 54. tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos, según grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 55. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos, según grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Tabla 56. Casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas El Dovio, 2005 – 2 | 201780 |
| Tabla 57. Número de muertes en hombres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 municipio El Dovio, 2005 – 2017 | |
| Tabla 58. Número de muertes en hombres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 subgr causas municipio El Dovio, 2005 – 2017 | |
| Tabla 59. Número de muertes en mujeres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 | ' causas |
| municipio El Dovio, 2005 – 2017 | 90 |
| Tabla 60. Número de muertes en mujeres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 subgi | rupos de |
| causas municipio El Dovio, 2005 – 2017 | 92 |
| Tabla 61. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez | 96 |
| Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio l 2005- 2016 | |
| Tabla 63. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016 | 98 |
| Tabla 64. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016 | 99 |
| Tabla 65. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 100 |
| Tabla 66. Tasa de mortalidad materna, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 101 |
| Tabla 67. Tasa de mortalidad neonatal, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 102 |
| Tabla 68. Tasa de mortalidad infantil, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 103 |
| Tabla 69. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 104 |

| Tabla 70. Razón de mortalidad materna por Etnia, municipio El Dovio | .104 |
|--|------|
| Tabla 71. Razón de mortalidad materna por área, municipio El Dovio | .105 |
| Tabla 72. Tasa de mortalidad neonatal por Departamento, Municipio y Etnia | 106 |
| Tabla 73. Tasa de mortalidad neonatal por Área, municipio El Dovio | .117 |
| Tabla 74. Identificación de prioridades en salud del Municipio El Dovio 2016 | .108 |
| Tabla 75. Proporción de las principales causas de morbilidad en ambos sexos, municipio El De 2009 – 2016. | |
| Tabla 76. Proporción de las principales causas de morbilidad en hombres, municipio El Dovio 20 2016 | |
| Tabla 77. Proporción de las principales causas de morbilidad en mujeres Municipio El Dovio, 20 2016 | |
| Tabla 78. Morbilidad por subgrupos en hombres Municipio El Dovio, 2009 – 2016 | .117 |
| Tabla 79. Morbilidad por subgrupos en mujeres Municipio El Dovio, 2009 – 2016 | .118 |
| Tabla 80. Morbilidad por subgrupos en Ambos Sexos Municipio El Dovio, 2009 – 2016 | .119 |
| Tabla 81. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Municipio El Dovio, valle Cauca 2006 – 2017 | |
| Tabla 82. Semaforización eventos Precursores del Municipio El Dovio, valle del Cauca 201 2017 | |
| Tabla 83. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Do 2006- 2017 | |
| Tabla 84. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Dovio (Valle Cauca). Acumulado a Septiembre 30 de 2018 | |
| Tabla 85. Distribución de las alteraciones permanentes por Grupos de edad para mujeres, acumu | lado |
| a septiembre 30 de 2018. Municipio de El Dovio | 122 |
| Tabla 86. Distribución de las alteraciones permanentes por Grupos de edad para hombres, acumu | lado |
| a septiembre 30 de 2017. Municipio de El Dovio | 123 |

| Tabla 87. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida y eventos de notificación obligatoria Municipio de El Dovio |
|---|
| Tabla 88. Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida del Municipio de El Dovio127 |
| Tabla 89. Desagregación según urbano-Rural128 |
| Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud – seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2006-2016128 |
| Tabla 91. Determinantes intermedios de la salud – factores psicológicos y culturales del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2006-2017129 |
| Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud – sistema sanitario del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2005-2016 |
| Tabla 93. Servicios habilitados de las instituciones Prestadoras de Salud por el Municipio de El Dovio, valle del cauca 2017130 |
| Tabla 94. Otros indicadores del sistema sanitario en el Municipio de El Dovio, valle del cauca 2015132 |
| Tabla 95. Otros indicadores de ingreso, cabecera- Municipio de El Dovio, valle del cauca DANE 2008-2011132 |
| Tabla 96. Otros indicadores de ingreso, Rural- Municipio de El Dovio, valle del cauca DANE 2005-2011133 |
| Tabla 97. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2005-2017133 |
| Tabla 98. Priorización de los problemas de salud del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2016135 |
| |

LISTA DE FIGURAS

| Figura 1- Pirámide poblacional del municipio El Dovio, 2005, 2018, 2020 |
|---|
| Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, del municipio El Dovio 2005, 2018 y 2020)35 |
| Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio, 201836 |
| Figura 4. Comparación entre Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad El Dovio 2005-2016 |
| Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201643 |
| Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 201644 |
| Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del departamento/ distrito / municipio 2005 – 2016 |
| Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas en hombres y mujeres de municipio El Dovio, 2005 a 201646 |
| Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres – municipio El Dovio, 2005 a 201647 |
| Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en Mujeres municipio de El Dovio, 2005 a 201647 |
| Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67. Hombres y mujeres El Dovio, 2005 – 2016 48 |
| Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en Hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en Mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201650 |
| Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 201651 |
| Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 |
| Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201653 |
| Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 201654 |
| Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201655 |
| Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201656 |
| Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 201657 |
| Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 201658 |

| Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulato hombres y mujeres del municipio de El Dovio, donde sobresalen las enfermedades hipertens – 2016 | sivas, 2005 |
|---|-------------|
| Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinata hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinata mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinata hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 26. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo del municipio de El Dovio, 2005 - 2016 | = |
| Figura 27. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo per | rinatal de |
| municipio de Florida, 2005 – 2016. | 64 |
| Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del m de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del mu El Dovio, 2005 – 2016 | • |
| Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres y muj municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hon municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en muj municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hon mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal de hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal de mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | efinidas er |
| Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal de hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016 | |
| Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016 | 98 |
| Figura 38. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016 | 99 |
| Figura 39. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 100 |
| Figura 40. Tasa de mortalidad materna, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 101 |
| Figura 41. Tasa de mortalidad neonatal, municipio El Dovio, 2005-2016 | 102 |
| Figura 42. Tasa de mortalidad infantil, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 103 |
| Figura 43. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio El Dovio, 2005 – 2016 | 104 |
| Figura 44. Razón de mortalidad materna por Etnia, municipio El Dovio | 105 |

| Figura 45. Razón de mortalidad materna por área, municipio El Dovio | 106 |
|---|-----|
| Figura 46. Tasa de mortalidad neonatal por Departamento, Municipio y Etnia | 107 |
| Figura 47. Razón de mortalidad neonatal por área, municipio El Dovio | 108 |
| Figura 48. Pirámide de la población en condición de discapacidad | 124 |
| | |
| LISTA DE MAPAS | |
| Mapa 1. División política administrativa y limites, Municipio El Dovio municipio 2012 | 21 |
| Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio El Dovio 2012 | 26 |
| Mapa 3. Municipio de El Dovio, estado de las vías terrestres internas | 30 |
| Mapa 4. Municipio de El Dovio, estado de las vías terrestres en la parte Urbana | 30 |

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asís. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de El Dovio se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2018, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es Septiembre de 2018, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a Octubre de 2018.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2016; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2017. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2014. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad maternoinfantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del Análisis de Situación de Salud 2018 del Municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca
- ✓ Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaria de Salud Municipal de El Dovio Valle
- ✓ Hospital Santa Lucia E.S.E. de El Dovio

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico. Se utilizará la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permitirá visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la población.

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de El Dovio está ubicado en la parte Noroccidental del departamento del Valle del Cauca, su relieve corresponde a la vertiente occidental de la cordillera de los andes y presenta algunos accidentes geográficos, entre ellos: Cerro de Paramillo, las Cuchillas del Garrapatas, Monte azul, Cierra Mocha y Sirimunda, tal situación lo hace partícipe de las tierras cálidas, húmedas y selváticas de la provincia del pacífico y de la región andina con la cordillera occidental, por consiguiente cuenta con una gran diversidad de medios naturales y socio – económicos. Al Dovio principalmente lo riegan las aguas de los ríos: Rio Dovio, Peñones, Reyedó y el gran Río Garrapatas, el cual nace en el alto del cerro de los Galápagos en El Municipio del Cairo, con un recorrido de 79 Kms hasta el corregimiento de Bitaco, punto donde termina la cuchilla de nombre Magallanes.

Según ordenanza número uno (1) de 1958, por medio de la cual se le restituyó al municipio su antiguo nombre de El Dovio, los límites municipales son los siguientes:

- ✓ Limite Norte: Desde el Municipio de Versalles hasta el Departamento del Choco.
- ✓ Limite Oeste: Desde el Departamento del Choco hasta el Municipio de Bolívar.
- ✓ Límite Sur: Desde el municipio de bolívar hasta el municipio de Roldanillo.
- ✓ Limite Este: Desde el municipio de Roldanillo continuando por el municipio de la Unión hasta el Municipio de Versalles.

✓

El territorio Municipal de El Dovio tiene un perímetro de 160 Km. y una extensión total de 382, 563 Km2, área que cartográficamente está representada en dos zonas distribuidas de la siguiente manera: la zona A 24.681,3 Has que indican el 64%. En esta parte también se encuentra ubicado el sector urbano con 66 has equivalentes al 0.17% y la zona B posee 13.575 has que representan el 35,48% del área total del territorio.

El total de extensión geográfica del Municipio de El Dovio es de 382, 563 Km2, teniendo el mayor porcentaje de su extensión geográfica en la zona rural, con un 99.83%.

La tabla 1 permite apreciar en detalle la extensión territorial


Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2013

| Municipio | Extensión urbana | | Extensión rura | al | Extensión tota | I |
|-----------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Walliopio | Extensión | Porcentaje | Extensión | Porcentaje | Extensión | Porcentaje |
| El Dovio | 66 Km2 | 0.17% | 382,497 Km2 | 99.83% | 382,563 Km2 | 100% |

Fuente: Planeación Municipal

El mapa visualiza la división política administrativa, límites geográficos y extensión territorial.

Mapa 1. División política administrativa y limites, Municipio El Dovio.



Página 21 | 136

1.1.2. Características físicas del territorio

La zona rural del Municipio está conformada por 13 corregimientos, incluido el resguardo indígena de Batatal y 47 veredas distribuidas de la siguiente manera:

- ✓ Corregimientos: Monte azul, La Pradera, Bitaco, El Dúmar, El Oro, La Esperanza, La Cabaña, Toldafría, Lituania, Playa Rica, Santa Teresa, Sirimunda y El Guachal.
- ✓ Veredas: Samaná, Callelarga, El Cielito, Matecaña, Cañada honda, El Lular, El Crucero, Los Zainos, Bellavista, Ojedas, La María, Las Vueltas, El Guadual, La Virginia, La Rivera, La Peña, El Consuelo, Sabanablaca, Birmania, Montebello, Guatemala, Maravelez, La Hondura, La Dorada, Altomiranda, Santa Elena, Bosquetarzo, Buenos Aires, El Pedral, Batatal, Alto Hermoso, Cuba, El Castillo, El Diamante, El Filo, Guadualejo, La Capilla, La Máquina, La Selva, La Tortuga, Las Cabañas Bajas, Puente Cable, Rio Dovio, Rio Lindo, Rio Mono y Villa Rica.

Tabla 2. Distribución de las veredas según su corregimiento

| DISTRIBUCIÓN DE LAS VEREDAS SEGÚN SU CORREGIMIENTO | | | |
|---|--|--|--|
| LA CABAÑA | La Cabaña, Bellavista, Los Zainos, Ojedas, El Crucero El Lular y Cañada Honda. | | |
| LA ESPERANZA | La Esperanza, Matecaña | | |
| EI ORO | El Oro, Cielito, Calle Larga, Samaná. | | |
| MONTEAZUL | Monteazul, Buenos Aires, El Bosque. | | |
| SIRIMUNDA | Siriunda, Santa Elena, La Hondura, Guatemala, Las Vueltas. | | |
| PRADERA | La Pradera, La Dorada, Balcanes, Peñones. | | |
| EL DOMAR | El Dumar, Altomiranda, Maravelez. | | |
| LITUANIA | Lituania, Sabana Blanca, El Consuelo. | | |
| PLAYA RICA | Playa Rica, Birmania, Montebello, El Pedral. | | |
| BITACO | Bitaco, La Rivera, La Peña. | | |
| EL DIAMANTE | Tolda fría, El Diamante, La Virginia, La María, La Aguadita, El Guadual | | |
| BATATAL | La Capilla, Puente Cable, Batatalito, | | |
| (Resguardo | Alto Hermoso | | |
| Indígena) | | | |

Fuente: Secretaria de Planeación El Dovio

Zona Urbana Se encuentra divida por 21 barrios así: La Merced, Villa Emma Motoristas, Benjamín Perea Nuevo Amanecer, Nicolás Borrero, Fundadores, Las Colinas, El Rodeo, Municipal, José Antonio López, El Carmen, El Porvenir, Los Alpes, Pro Vivienda, Puerto Betania, Unión de Vivienda, Las Acacias, El Oasis, Ciudadela Héctor Urdinola.

Altitud Y Relieve

Relieve: La mayor parte del territorio es montañoso, compuesto por rocas ígneas en donde se encuentra intercalado dos tipos de formaciones, que dan origen a suelos con diversos grados de evolución y fertilidad. Dentro del paisaje montañoso sobresale la Serranía de Los Paraguas que es un ramal de la cordillera Occidental y conforma la cuenca hidrográfica del Río Garrapatas y es considerado un ecosistema estratégico de importancia vital para la región. Por estar ubicado sobre la Cordillera Occidental la mayor parte del Municipio es montañosa, teniendo como único valle, la parte donde hoy se encuentra ubicado el Pueblo que ocupa el puesto No.30 entre los 42 Municipios. Los Cerros y montañas son la Serranía de Los Paraguas, la cual ha sido declarada "RESERVA ECOLÓGICA", El Cerró Paramillo, Las Cuchillas de El Garrapatas y Monte azul, Sierra Mocha y Sirimunda. Las montañas más altas son: Cerro de Paramillo (2.050 m.s.n.m) en la vereda Las Vueltas y Sirimunda, Cerro Cara De Perro (2.050 m.s.n.m) en la vereda La Dorada, Alto de Paramillo (1.850 m.s.n.m) en la vereda Bellavista y El Cerro Toldafría (1.847 m.s.n.m) en la vereda Toldafría.

Minería: En el municipio de El Dovio existen betas de minas de diferentes metales de las cuales no se tiene un estimativo de cantidad productiva ni su valor económico. Entre ellas, está la mina de cobre ubicada en la vereda Sabana Blanca, además se ha detectado la presencia de metales y piedras preciosas en los sectores de Birmania Guatemala y Balcanes. A pesar de que el municipio hace parte del distrito minero Cali-Dovio no se ha realizado la explotación de dichas minas ya que se encuentran en pleno corazón de la serranía de los paraguas, que pertenece a la reserva forestal del pacifico declarada por la Ley 2 del 1959.

Hidrografía

A El Dovio lo bañan las aguas de los ríos: Dovio, Peñones, Río Claro y El Río Garrapatas con todos sus afluentes. El Río más importante es el Garrapatas, con una extensión de 79 Kilómetros, y recorre las veredas La Pradera, La Hondura, Monte azul, Maravelez, Guatemala, Lituania, Bitaco, Balcanes, El Dúmar, Sirimunda, La Peña, Montebello, Playa Rica, El Pedral, y El Resguardo Indígena del Cañón del Rio Garrapatas. Otros ríos importantes son: Río Dovio que surte de agua el acueducto municipal y para el riego por donde pasa su recorrido, además de los ríos Almorzadero, Cauquita, Quebrada El Castillo que utilizan sus recorridos también para el riego de hortalizas en la zona plana. Este inventario del Recurso hídrico del municipio da cuenta de la

gran riqueza y la alta potencialidad que tiene la región en la medida en que se planifique un desarrollo sostenible conciliando la aptitud de los suelos y se busque la conservación de estos.

Zonas de riesgo

Clasificación de las amenazas naturales por: Inundación, Movimiento en masa, Dinámica del río o quebrada, Escorrentía, Incendio, Inundación

Existe una amenaza natural en estado potencial identificado como movimiento en masa escorrentía en el sector alto de la urbanización las colinas construida en zona de fuerte pendiente sucede erosión lateral sin ningún tipo de control y diseño.

(Alcaldía El Dovio-primer esquema de ordenamiento territorial-2001-2003)

Existen cuatro sitios identificados en el plano de amenazas que históricamente en la zona Urbana sufren inundación en la época invernal, los trastornos ocasionados suceden en los lotes continuos con la orilla de la Quebrada Cauquita en el barrio municipal y el río Dovio en el sector de Puerto Betania, donde el caudal aumenta inundando algunos solares cultivados. También en el sector de Puerto castillo el diámetro de la tubería es reducido, causando inundación en algunos barrios de este sector.

Los sectores en riesgo de inundación son: La Merced, Las Colinas y El Rodeo. En épocas de crecientes, el río se desborda por este sector, al igual que la quebrada cauquita, donde construyeron viviendas en su zona protectora. Se pone en riesgo las familias asentadas en el sitio. El deterioro de la cuenca hidrográfica por detrimento de la cobertura forestal, hace que, para una misma condición de lluvias, las crecientes sean más altas que las que se presentaban hace 20 años, razón por la cual hay más área que se inunda en la parte urbana por donde pasa el río. (Alcaldía El Dovio, Plan de Desarrollo 2012-2015)

Riesgo Antrópico e Impacto Ambiental

Para el cañón del Río Garrapatas el fenómeno de deforestación avanza en la medida que se colonizan nuevas áreas, la presencia de nuevos asentamientos indígenas están deforestando buena parte de bosques vírgenes, como en el caso de la vereda Guatemala, donde ya casi acaban con el bosque, razón por la cual es necesario tomar medidas tendientes a detener esta depredación. En general la mayor parte de los suelos del municipio son de clima húmedo templado, moderadamente erosionados y de fertilidad baja a media, donde se deben efectuar prácticas de manejo y conservación de suelos, como la búsqueda de alternativas de producción sostenibles.


Erosión en los suelos.

Estos problemas no se encuentran en una etapa muy avanzada, pero sus consecuencias ya se están haciendo sentir y son causadas por factores tales como: mal uso y manejo de suelos, tala de Bosques, incremento en la ganadería en áreas de ladera, mala disposición de desechos sólidos y líquidos.

El sitio que presenta un gran movimiento de tierra en el sector denominado la mesa, Otros sitios de importancia en este sentido está ubicado en la vereda de La Peña y la Hondura; además en diferentes sitios de la topografía del municipio se ha incrementado derrumbes conocidos como golpe de cuchara.

Temperatura Y Humedad.

Temperatura de 20 Grados Centígrados, la oscilación de temperatura es mayor en los sectores bajos y disminuye en las montañas, dada la presencia de nubes y humedad relativa a media ladera. La zona de clima frío corresponde a los picos más altos del municipio y están dispersos por todo el territorio, de manera que el paisaje de muchas de las veredas contiene tres de los pisos térmicos. La mayor parte del territorio del municipio corresponde al piso térmico templado, donde se encuentran las vertientes templadas entre mil y dos mil metros sobre el nivel del mar, y el cinturón cafetero con cultivos intensivos y bosque subandino. Las zonas de piso térmico cálido 430 y 100 metros sobre el nivel del mar y temperatura mayor a 24 °C como el cañón del Río Garrapatas, son tierras de superficie colinadas y vertientes con fertilidad media y donde se debe proteger la vegetación natural.



Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio El Dovio

Fuente: Secretaria de Planeación El Dovio

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

La relación funcional de mayor importancia la define, la vía pavimentada en sentido oriente del Municipio que lo comunica con Roldanillo a una distancia de 28 kilómetros, recorridos en un tiempo aproximado entre 35 y 40 minutos dependiendo del tipo de vehículo y conductor, además permite tener accesibilidad con los Municipios del Norte, Centro y Sur del departamento. Al confluir con las vías Panorama y Panamericana, exactamente en el Municipio de Zarzal, punto importante porque permite el desplazamiento hacia todo el país. La vía El Dovio-Quebrada actualmente se encuentra pavimentada en su totalidad y alcanza una distancia de 9.5 kilómetros hasta el límite con los Municipios de la Unión y Versalles. La vía sin pavimentar El Dovio-Bitaco – Playa rica, su recorrido alcanza una distancia de 37 Kilómetros, en sentido Occidente del Municipio, continuando por camino de herradura, que permite comunicarse con el Resguardo Indígena Embera Chami,

en el punto de confluencia del Río Garrapatas, con el río Reyedó, por el cual se llega al Departamento del Chocó y con el Municipio de Bolívar, por la vertiente izquierda del río Garrapatas.

Tiempo de traslado:

El tiempo de traslado del municipio, hacia la ciudad capital del departamento es de 3 horas y 9 minutos y se encuentra a una distancia de 126,17 kilómetros y el desplazamiento es por vía terrestre totalmente pavimentada.

Distancias en kilómetros.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Dovio 2013

| Municipios | Tiempo de llegada desde El Dovio a la ciudad capital del departamento, en minutos. | Distancia en Kilómetros desde El Dovio a la ciudad capital del departamento, en minutos. | Tipo de transporte desde El Dovio a la ciudad capital del departamento, en minutos. |
|------------|---|--|---|
| Cali | 3h 9 min | 126,17 km | Terrestre |

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS

El municipio más cercano es Roldanillo, con un tiempo de 40 a 50 minutos y el más lejano, entre los municipios vecinos es Tuluá a una distancia de 68 Km y con un tiempo de llegada en transporte terrestre de 55 minutos

Tabla 4. Tiempo y distancia entre municipio vecinos

| Municipio Vecino | Distancia en Km. entre el municipio y su municipio | Tipo de transporte entre el municipio y el | Tiempo estimado el municipio al m | del traslado entre unicipio vecino |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Voolito | vecino | municipio vecino | Horas | Minutos |
| Roldanillo | 11,359 | Terrestre | 0 | 40 a 50 |
| La Unión | 32,977 | Terrestre | 0 | 50 |
| Versalles | 16,80 | Terrestre | 0 | 30 |
| Zarzal | 29,5 km | Terrestre | 1 | 20 |
| Cartago | 70,6 km | Terrestre | 1 | 50 |
| Tuluá | 68,5 km | Terrestre | 1 | 55 |

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS

Tabla 5. Sistema de comunicación vial entre el área urbana y rural del municipio de El Dovio

| ITEM | | TRAMO VIA | UNIDADES | LONGITUD | DIRECCION | ESTADO ACTUAL |
|------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| | | | DE COMUNICACIÓN | Mts | ENTORNO URBANO- RURAL | |
| | | MATECAÑA | | 2250 | | |
| 01 | DOVIO | ROLDANILLO | 1 | 4540 | DOVIO – ESTE | PAVIMENTADA |
| 00 | DOVIO | SAMANA | _ | 1540 2900 | DOMO CUD | CINI DAY/IMENTAD |
| 02 | | LA ESPERANZA CALLE LARGA | 2 | 1960 | DOVIO – SUR | SIN PAVIMENTAR |
| 03 | DOVIO | CIELITO | 3 | 3460 | DOVIO- SUR | SIN PAVIMENTAR |
| | 501.0 | EL ORO | _ | 1620 | 20110-0011 | OHTTAVIMENTAL |
| | DOVIO | LA AGUADITA | | 2700 | | |
| 04 | | EL GUADUAL | 4 | 6300 | DOVIO OESTE | SIN PAVIMENTAR |
| | | LA AGUADITA | | 1560 | | |
| | | LA MARÍA | | 2560 | | |
| | DOVIO | EL GUADUAL | 5 | 4100 | 50.00 05075 | |
| 0.5 | | EL DIAMANTE TOLDA FRÍA | LÍNEA PRINCIPAL | 2660 | DOVIO -OESTE | SIN PAVIMENTAR |
| 05 | | LA RIVERA | | 2700 2300 | | |
| | | BITACO | | 2300 | | |
| | | PLAYA RICA | | 2000 | | |
| 06 | DOVIO | SUBTOTAL | 6 | 3700 | DOVIO OESTE | SIN PAVIMENTAR |
| | | | | | | |
| | | BITACO | | 15880 | | |
| | DOVIO | LA PEÑA EL CONSUELO | | 4900 5000 | DOVIO OESTE | SIN |
| 07 | DOVIO | LITUANIA | 7 | 2200 | DOVIO GESTE | PAVIMENTAR |
| 07 | | SABANA BLANCA | ' | - | | LAVIMENTAL |
| | | GUADEMALA | | 12600 | | |
| | | LA HONDURA | | 6300 | | |
| | | SIRIMUNDA | _ | 3400 | | |
| | DOVIO | SANTA ELENA | 8 | 1200 | DOLUG OFFITE | CINI |
| 08 | | MONTE AZUL BUENOS AIRES | | 2500 4360 | DOVIO –OESTE NORTE | SIN PAVIMENTAR |
| | | EL BOSQUE | | 4100 | NORTE | FAVINILITIAN |
| | DOVIO | GUATEMALA | | 11460 | DOVIO -OESTE | SIN |
| 09 | | MARAVELEZ | 9 | 5400 | NORTE | PAVIMENTAR |
| | | GUATEMALA | | 12600 | | |
| | DOVIO | PEÑONES | 40 | 11760 | DOI 110 05075 | |
| 10 | | LA PRADERA LA DORADA | 10 | 4900 4400 | DOVIO OESTE NORTE | SIN PAVIMENTAR |
| 10 | | PENONES | | 4900 | NORTE | |
| 11 | | BALKANES | 11 | 2500 | ESTE OESTE | SIN |
| | | ALTOMIRANDA | | 2100 | | PAVIMENTAR |
| | | LA AGUADITA | | 1660 | | SIN |
| | | LA MARIA | | 3200 | | PAVIMENTAR |
| 12 | DOVIO | LAS VUELTAS SUBTOTAL | 12 | 4400 9260 | DOVIO OESTE NORTE | |
| | | EL CRUCERO | | 9260 4200 | NORTE | |
| | | EL LULAR | | 3560 | | |
| | DOVIO | LA CABAÑA | | 3380 | | SIN |
| 13 | | OJEDAS | 13 | - | DOVIO NOR - ESTE | PAVIMENTAR |
| | | LOS ZAINOS | | - | | |
| | | BELLASVISTA | | - | | |
| 44 | DOV/IC | CAÑADA HONDA | 44 | 5800 | DOMO FOTE | SIN PAVIMENTAR |
| 14 | DOVIO | 1 | 14 | | DOVIO-ESTE | |

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal-El Dovio

En el mapa 3 se describe el estado de las vias de comunicación internas del Municipio de las donde se resalta su amplia distribucion en la zona Rural que en su taotalidad se encuentra ubicada en la parte montañosa, son vias donde la gran mayoria estan sin pavimentar, en la parte Urbana se describe en el mapa 4 y según el mapa se resalta su amplitud y un gran porcentaje de vias pavimentadas.

MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA
FUENTE: OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
DIVISION VERBALLY VIAL

RICA

Mapa 3. Municipio de El Dovio, estado de las vías terrestres internas.

Fuente: Secretaria de Planeación de El Dovio



Mapa 4. Municipio de El Dovio, estado de las vías terrestres en la parte Urbana.

Fuente: Secretaria de Planeación de El Dovio

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población total en el Municipio de El Dovio para el año 2018 es de 8236 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de El Dovio, presenta una superficie total de 382.56 Km cuadrados, para una densidad de 21,5 habitantes por kilómetro cuadrado, la superficie del área urbana es de 66 Km, con una densidad poblacional de 124,7 habitantes por kilómetro cuadrado, la extensión en el área rural es de 316.56 con una densidad poblacional de 26,01 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia Urbano/Rural

El porcentaje de población es más alta en el área urbana 4.936 habitantes, que en la zona rural 3.300 habitantes, tabla 6.

Tabla 6. Población por área de residencia Municipio de El Dovio 2018

| Municipio | Población urba | ana | Población rural | | Población | Grado de |
|-----------|----------------|------------|----------------------|--|-----------|--------------|
| | Población | Porcentaje | Población Porcentaje | | total | urbanización |
| El Dovio | 4.936 | 60% | 3.300 40% | | 8.236 | 60 |

Fuente: DANE

Grado de urbanización

El porcentaje de la población que reside para el año 2018 en áreas urbanas respecto a la población es del 60%.

Número de viviendas

Según el Censo DANE 2005 En el Municipio de El Dovio, cuenta con un total de 2533 viviendas, de las cuales el 90,25% son casa o apartamento, y el 9.47 % cuartos. De estas viviendas solo el 55 % son de ladrillo, y el 41 % los pisos son de cemento o gravilla.

Número de hogares

Según Censo DANE 2005 para el Municipio de El Dovio se estima 2459 Hogares.

Tabla 7. Tipo de Vivienda existente.

| ZONA | NOMBRE ZONA | CASA O APARTAMENTO | CUARTO | OTRO TIPO | CASA INDÍGENA | TOTALES |
|------|----------------|-----------------------|--------|--------------|------------------|---------|
| 1 | Cabecera | 1290.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1378 |
| 2 | Centro Poblado | 328.00 | 51.00 | 0.00 | 3.00 | 382 |
| 3 | Rural Disperso | 668.00 | 101.00 | 0.00 | 4.00 | 773 |
| | TOTALES | 2286.00 | 240.00 | 0.00 | 7.00 | 2533 |
| | PORCENTAJE | 90.25% | 9.47% | 0.00% | 0.28% | 100% |

Fuente: SISBEN

Tabla 8. Material predominante en las paredes

| ZONA | NOMBRE ZONA | BLOQUE, LADRILLO, PIEDRA, MADERA PULIDA | TAPIA PISADA, ADOBE | BAHAREQUE | MATERIAL PREFABRICAD O | MADERA BURDA, TABLA O TABLÓN | GUADUA, CAÑA, ESTERILLA, OTROS VEGETALES | ZINC, TELA, CARTÓN, LATAS, DESHECHOS, PLÁSTICOS | TOTALES |
|------|----------------|---|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|--|---|---------|
| 1 | Cabecera | 1157.00 | 5.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1378 |
| 2 | Centro Poblado | 126.00 | 1.00 | 180.00 | 3.00 | 62.00 | 10.00 | 0.00 | 382 |
| 3 | Rural Disperso | 119.00 | 1.00 | 498.00 | 6.00 | 119.00 | 27.00 | 3.00 | 773 |
| | TOTALES | 1402.00 | 7.00 | 893.00 | 9.00 | 181.00 | 38.00 | 3.00 | 2533 |
| | % | 55.35% | 0.28% | 35.25% | 0.36% | 7.15% | 1.50% | 0.12% | 100% |

Fuente: SISBEN

Tabla 9. Material predominante en los pisos

| Zona | Nombre Zona | Alfombra, mármol, marqué, madera pulida | Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo | Cemento o gravilla | Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón | Tierra o arena | Otro | TOTAL ES |
|------|----------------|---|--|-----------------------|--|-------------------|-------|-------------|
| 1 | Cabecera | 8.00 | 667.00 | 621.00 | 73.00 | 9.00 | 0.00 | 1378 |
| 2 | Centro Poblado | 3.00 | 31.00 | 183.00 | 113.00 | 49.00 | 3.00 | 382 |
| 3 | Rural Disperso | 2.00 | 40.00 | 254.00 | 389.00 | 88.00 | 0.00 | 773 |
| | TOTALES | 13.00 | 738.00 | 1058.00 | 575.00 | 146.00 | 3.00 | 2533 |
| | PORCENTAJE | 0.51% | 29.14% | 41.77% | 22.70% | 5.76% | 0.12% | 100% |

Fuente: SISBEN

Tabla 10. Ubicación de los hogares del municipio de El Dovio,

| Id | Municipio | No. Hogares |
|----|-----------|-------------|
| 18 | El Dovio | 2.459 |

Fuente: Planeación Municipal

Población por pertenencia étnica

La mayor proporción de la población no tiene pertenencia étnica, con el 97% seguida de la población indígena con un 1.20 %

Tabla 11. Población por pertenencia étnica del Municipio de El Dovio- Valle del Cauca, 2018

| Municipio/Depto. | Pertenencia étnica | Total, por pertenencia étnica | Porcentaje de la población pertenencia étnica |
|------------------|---|-------------------------------|---|
| | Indígena | 2403 | 28% |
| | ROM (gitana) | - | 0,00% |
| El Dovio | Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia | - | 0,00% |
| | Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente | 89 | 1,00% |
| | Ninguno de las anteriores | 5914 | 71% |

Fuente: Planeación Municipal

1.2.1. Estructura demográfica

Los Indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina y por grupos quinquenales de edad, se puede resumir en una pirámide poblacional donde se comparan los años 2005, 2018 y la proyección al año 2020.

La pirámide poblacional del año 2005, 2018 y la proyección al año 2020 es constrictiva donde se evidencia en el año 2005 por cada 106 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 99 hombres, había 100 mujeres, además que por cada 43 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2018 por cada 38 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil, otro punto importante es que por cada 100 personas menores de 15 años en el año 2005, había 30 de 65 años o más, mientras que para el año 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 47 personas de 65 o más años.

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 65 personas menores de 15 años o mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 55 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.

80 Y MÁS **Hombres** Mujeres 75-79 **2**020 70-74 65-69 **2005** 60-64 **■**2018 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 Fuente: DANE 8% 6% 2% 2% 6% 8% 4% 4%

Figura 1- Pirámide poblacional del municipio El Dovio, 2005, 2018, 2020

Población por Ciclo de Vital

El análisis por ciclos vitales permite observar que todos los grupos de edad de menores de 24 años vienen disminuyendo su aporte porcentual al total de la población del Municipio, mientras el grupo de adultos y personas mayores aumentan progresivamente. Esto corrobora lo que se ilustraba en la pirámide, y es que la población del municipio tiende a estar conformada cada vez por más personas mayores que personas jóvenes.

Tabla 12. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de El Dovio - Valle del Cauca 2005, 2018 y 2020.

| | 2005 | | 20 |)18 | 2020 | | |
|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|--|
| Ciclo Vital | Número | Frecuencia | Número | Frecuencia | Número | Frecuencia | |
| | Absoluto | Relativa | Absoluto | Relativa | Absoluto | Relativa | |
| 0-4 | 1.016 | 10,6 | 778 | 9,4 | 757 | 9,4 | |
| 5-9 | 984 | 10,3 | 728 | 8,8 | 710 | 8,8 | |
| 10-14 | 1.093 | 11,4 | 702 | 8,5 | 651 | 8,1 | |
| 15-24 | 1.674 | 17,4 | 1.335 | 16,2 | 1.285 | 16,0 | |
| 25-34 | 1.272 | 13,3 | 1.303 | 15,8 | 1.309 | 16,3 | |
| 35-59 | 2.616 | 27,3 | 2.346 | 28,5 | 2.286 | 28,4 | |
| 60 y Más | 943 | 9,8 | 1.044 | 12,7 | 1.050 | 13,0 | |

Fuente: DANE

Población por grupo de edad

Por ciclo vital a través del tiempo, de los periodos censales 2005, 2018 y el año 2020, se encuentra que el mayor porcentaje de población se encuentra en la edad adulta, presentando una tendencia al aumento en el periodo, mientras la población en edad de adolescencia juventud presenta una tendencia a disminuir comparada con la proyección 2020.

Entre tanto las edades que van desde los 30-34 y 35-39 presentan un leve aumento, para lo cual las edades entre los 65-69 presentan estabilidad.

Tabla 13. Proporción de la población por grupo etario, del municipio (2005, 2018, 2020.)

| | 200 | 201 | 8 | 202 | 20 | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | |
| Total | 4.936 | 4.662 | 4.090 | 4.146 | 3.985 | 4.063 |
| 0-4 | 533 | 483 | 397 | 381 | 388 | 369 |
| 5-9 | 515 | 469 | 373 | 355 | 360 | 350 |
| 10-14 | 570 | 523 | 355 | 347 | 331 | 320 |
| 15-19 | 505 | 456 | 328 | 320 | 335 | 333 |
| 20-24 | 370 | 343 | 346 | 341 | 311 | 306 |
| 25-29 | 327 | 313 | 358 | 356 | 345 | 346 |
| 30-34 | 316 | 316 | 293 | 296 | 307 | 311 |
| 35-39 | 337 | 343 | 240 | 251 | 241 | 252 |
| 40-44 | 294 | 310 | 231 | 247 | 223 | 237 |
| 45-49 | 255 | 265 | 236 | 259 | 219 | 242 |
| 50-54 | 229 | 217 | 227 | 253 | 223 | 246 |
| 55-59 | 189 | 177 | 190 | 212 | 188 | 215 |
| 60-64 | 136 | 121 | 162 | 169 | 158 | 172 |
| 65-69 | 129 | 120 | 133 | 131 | 133 | 134 |
| 70-74 | 103 | 89 | 91 | 90 | 96 | 96 |
| 75-79 | 71 | 56 | 64 | 64 | 60 | 59 |
| 80 Y MÁS | 57 | 61 | 66 | 74 | 67 | 75 |

Fuente: DANE


| | 2005 | | 2 | 2018 | | 2020 |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Total | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| 0-4 | -6% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% |
| 5-9 | -5% | 5% | -5% | 4% | -4% | 4% |
| 10-14 15-19 | -6% -5% | 5% 5% | -4% -4% | 4% 4% | -4% -4% | 4% 4% |
| 20-24 | -4% | 4% | -4% | 4% | -4% | 4% |

| 25-29 | -3% | 3% | -4% | 4% | -4% | 4% |
|----------|-----|----|-----|----|-----|----|
| 30-34 | -3% | 3% | -4% | 4% | -4% | 4% |
| 35-39 | -4% | 4% | -3% | 3% | -3% | 3% |
| 40-44 | -3% | 3% | -3% | 3% | -3% | 3% |
| 45-49 | -3% | 3% | -3% | 3% | -3% | 3% |
| 50-54 | -2% | 2% | -3% | 3% | -3% | 3% |
| 55-59 | -2% | 2% | -2% | 3% | -2% | 3% |
| 60-64 | -1% | 1% | -2% | 2% | -2% | 2% |
| 65-69 | -1% | 1% | -2% | 2% | -2% | 2% |
| 70-74 | -1% | 1% | -1% | 1% | -1% | 1% |
| 75-79 | -1% | 1% | -1% | 1% | -1% | 1% |
| 80 Y MÁS | -1% | 1% | -1% | 1% | -1% | 1% |

Fuente: DANE

Para el 2005, 2018 y proyección 2020, podemos observar que personas entre los 0-4, 5-14, 15-24, 25-44 años de edad, tiene una disminución y que su mayor porcentaje predominan las personas entre los 5-14 años edad en comparación entre los años 2005 y la proyección 2020, luego podemos evidenciar que según la gráfica las personas con edades 45-59, 60-79, 80 y más tiene una estabilidad y un incremento leve. Figura 2.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, del municipio El Dovio 2005, 2018 y 2020).



Fuente: DANE

Población por grupos de edad

En el municipio de El Dovio para el año 2018, la distribución por sexo se presenta de manera similar entre hombres y mujeres, ya que la población de mujeres representa un 50,3% y los hombres un 49,7% respecto a toda la población para este año. La edad más frecuente en las mujeres de El Dovio se encuentra en el rango de 50-54 años (253 mujeres). En los hombres la población de mayor representación es la de menores entre 5-9 años con 373 personas. Los hombres son mayoría en los grupos quinquenales inferiores a 29 años, posteriormente, son las mujeres las más representativas para todos los grupos de edad mayores a 30 años. Figura 3.




Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2018.

Fuente: DANE

Otros indicadores demográficos

Las siguientes series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales.

Tabla 14. Otros Indicadores Demográficos. El Dovio

| Índices demográficos | Interpretación |
|--------------------------------|---|
| Poloción hombros/mujor | En el año 2005 por cada 106 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 99 hombres, |
| Relación hombres/mujer | había 100 mujeres |
| Danés nigas muias | En el año 2005 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para |
| Razón niños mujer | el año 2018 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil |
| Índice de infancia | En el año 2005 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 |
| Indice de Infancia | este grupo poblacional fue de 27 personas |
| Índias da inventud | En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este |
| Indice de juventud | grupo poblacional fue de 25 personas |
| Índias de vaisa | En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 |
| Indice de vejez | este grupo poblacional fue de 13 personas |
| Índice de envejecimiento | En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 30 de 65 años o más, mientras que para el año |
| marce de envejecimiento | 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 47 personas de 65 o más años |
| Índice demográfico de | En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 65 personas menores de 15 años o mayores de 65 |
| dependencia | años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 55 |
| dependencia | personas menores de 15 años o mayores de 65 años. |
| Índice de dependencia infantil | En el año 2005, 53 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que |
| marce de dependencia mantil | para el año 2018 fue de 42 personas |
| Índice de dependencia mayores | En el año 2005, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que |
| marce de dependencia mayores | para el año 2018 fue de 13 personas |
| | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población |
| Índice de Friz | de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la |
| 114100 401112 | población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población |
| | envejecida. |

Fuente: Proyecciones Datos DANE

Tabla 15. Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento/ municipio, 2005, 2018, 2020.

| Índice Demográfico | | Año | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| muice Demogranico | 2005 | 2018 | 2020 |
| Población total | 9.598 | 8.236 | 8.048 |
| Población Masculina | 4.936 | 4.090 | 3.985 |
| Población femenina | 4.662 | 4.146 | 4.063 |
| Relación hombres: mujer | 105,88 | 98,65 | 98 |
| Razón niños: mujer | 43 | 38 | 37 |
| Índice de infancia | 32 | 27 | 26 |
| Índice de juventud | 24 | 25 | 25 |
| Índice de vejez | 10 | 13 | 13 |
| Índice de envejecimiento | 30 | 47 | 50 |
| Índice demográfico de dependencia | 64,94 | 54,96 | 54,47 |
| Índice de dependencia infantil | 53,15 | 41,54 | 40,65 |
| Índice de dependencia mayores | 11,79 | 13,41 | 13,82 |
| Índice de Friz | 166,42 | 139,11 | 137,11 |

Fuente: Datos proyecciones DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

A continuación, se describe el comportamiento de los indicadores de tasa bruta de natalidad y mortalidad.

Tasa Bruta de Natalidad: cómo podemos observar en la tabla hay un aumento leve entre los años 2005 y 2006, pero hay una caída notable en los años 2007 y 2008; para el año 2009 hay una breve ascendencia, pero desciende notablemente los años 2010, 2011 y 2012; ya para los años 2013 y 2014 hay un leve aumento, para el año 2015 disminuye el porcentaje, cerrando con un 2016 con incremento.

Tasa Bruta de Mortalidad: El comportamiento es variable, vemos en la tabla una estabilidad relativa sin mucha variedad en los años 2005, 2006 y 2007, ya para el año 2008 se nota una ascendencia, pero disminuye para el año 2009; ya para los años 2010 y 2011 se presentó un leve incremento, y que a partir del año 2012 y 2013 disminuye notoriamente, y ya para el 2014 podemos apreciar un porcentaje considerable del 8,49, con variable a la baja en el año 2014, pero cerrando con un 2016 a la alza.

25 Por cada mil habitantes 20 15 10 0 Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 6,97 8,88 8,49 6,70 7,83 8,57 6,48 7,56 6,14 5,17 8,33 22.30 23.70 18.02 14.50 16.55 16,16 15.45 14.22 16.75 12,46 15,11

Figura 4. Comparación entre Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad El Dovio 2005-2016.

Fuente: DANE

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se describe la capacidad reproductiva de la población del municipio de El Dovio.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: para el año 2005 el municipio de El Dovio nacen 9,56 niños por cada 1000 mujeres entre 10 a 14 años, seguidamente la tendencia es a la baja hasta el

año 2007 donde la tasa solo llega a 2,07; en el año 2009 la tasa se incrementa hasta llegar al 11,60 niños nacidos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años; para los años 2010 a 2012 la tendencia es variable pero aun así por debajo del valor alcanzado en el año 2009; para el año 2013 se alcanza la tasa más alta del periodo de análisis, llegando al 13,66.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: para el año 2005 el municipio de El Dovio nacen 52,09 niños por cada 1000 mujeres entre 10 a 14 años, seguidamente la tendencia aumenta en el año 2006 donde la tasa llega a 71,43 niños nacidos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años; para los años 2007 a 2012 la tendencia es variable pero aun así por debajo del valor alcanzado en el año 2006; para el año 2013 la tasa es de 57,97, siendo la tasa del año 2006 la más alta del periodo de análisis.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: para el año 2005 el municipio de El Dovio nacen 100,88 niños por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años, seguidamente en el año 2006 se presenta la tasa más alta de todo el periodo de análisis, alcanzando un valor de 143,48; para los años 2007 a 2009 la tendencia es a la baja donde la tasa mínima llega al 76,09; para los años 2010 y 2011 la tendencia es variable a la alza terminando en el año 2012 con una tasa del 65,06 niños nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años, para los siguientes años desde el año 2013 a 2016 se observa una variación que fluctúa y termina un año 2016 con una tasa de 110,45 niños nacidos por cada 1000 mujeres entre los 15-19.

Tabla 16. Comportamiento de la Tasa Especifica de Fecundidad en el Municipio de El Dovio, 2005-2016

| EDAD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 10-14 Años | 9,56 | 5,93 | 2,07 | 2,18 | 11,60 | 4,90 | 7,73 | 5,35 | 13,66 | 8,31 | 11,08 | 5,60 |
| 15-19 Años | 100,88 | 143,48 | 92,87 | 81,90 | 76,09 | 91,11 | 91,95 | 65,06 | 99,24 | 88,71 | 77,14 | 110,45 |
| 10-19 Años | 52,09 | 71,43 | 46,46 | 42,30 | 44,89 | 50,12 | 52,25 | 36,76 | 57,97 | 49,11 | 43,60 | 56,36 |

Fuente: DANE

1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado

Aunque el Municipio y su población aún sufren, ya en menor proporción, las consecuencias del conflicto armado y las disputas territoriales que se vivieron años atrás, el desplazamiento forzado interno y violación de los Derechos Humanos, se ha visto disminuido en todo el territorio.

El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada desplazada en cuanto a condiciones como edad y sexo. A continuación, se Describe la distribución de la población victimizada de desplazamiento por edad y sexo del municipio de El Dovio, la población víctima del conflicto y de desplazamiento está siendo escuchada y se encuentra identificada para brindar más apoyo por parte de la administración.

En el Municipio de El Dovio a septiembre 19 de 2018 se identifican 2706 personas víctimas de conflicto armado, de las cuales el 55,6% son mujeres (1.504) y el 42% son hombres (1.137). No se tiene dato del sexo del 2% (65 casos).

Tabla 17. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio El Dovio, corte 19 de Septiembre de 2018.

| GRUPOS DE EDADES | FEMENINO | MASCULINO | NO DEFINIDO | NR - NO REPORTADO | TOTAL |
|------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| De 0 a 4 años | 51 | 59 | | 3 | 113 |
| De 05 a 09 años | 124 | 118 | | 7 | 249 |
| De 10 a 14 años | 159 | 161 | | 23 | 343 |
| De 15 a 19 años | 168 | 153 | | 27 | 348 |
| De 20 a 24 años | 122 | 105 | | 3 | 230 |
| De 25 a 29 años | 133 | 78 | | | 211 |
| De 30 a 34 años | 118 | 67 | | | 185 |
| De 35 a 39 años | 107 | 62 | | | 169 |
| De 40 a 44 años | 95 | 60 | | | 155 |
| De 45 a 49 años | 89 | 46 | | | 135 |
| De 50 a 54 años | 87 | 46 | | | 133 |
| De 55 a 59 años | 79 | 42 | | | 121 |
| De 60 a 64 años | 45 | 29 | | | 74 |
| De 65 a 69 años | 32 | 24 | | | 56 |
| De 70 a 74 años | 31 | 16 | | | 47 |
| De 75 a 79 años | 13 | 20 | | | 33 |
| De 80 años o más | 26 | 32 | | | 58 |
| No Definido | 25 | 19 | | 2 | 46 |
| TOTAL | 1.504 | 1.137 | | 65 | 2.706 |

Fuente: bodega de datos de SISPRO. Registro Único de Víctimas

Dinámica Migratoria

El Municipio de El Dovio no hay reporte de personas que se hayan atendido con procedente de otro país.

Conclusiones Caracterización de los Contextos Territoriales y Demográficos.

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años,

Alcaldía Municipal El Dovio Valle Soluciones para el progreso Municipal

jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social).

El municipio de El Dovio es decididamente rural en cuanto a su extensión geográfica, de características montañosas sobre la cordillera occidental y con riquezas minerales y rica hidrografía, tiene variadas potencialidades en su territorio. Las condiciones del terreno y el detrimento de la cobertura forestal, hacen que los riesgos naturales estén presentes en gran parte del Municipio. A pesar de que el Municipio tiene una zona rural grande en extensión, la población habita en mayor medida en la zona urbana.

En El Dovio la población es relativamente joven y las tasas de natalidad aumentaron para el año 2013. Además, el mayor porcentaje de población por ciclo vital se encuentra en el grupo de 25 a 44 años para el año 2013, la cual va en aumento. Las tasas de mortalidad bruta tuvieron tendencia al aumento hasta el año 2010, pero de 2011 a 2013, 2014, 2015 y 2016 disminuye. Esto lleva a que la población del Municipio vaya descendiendo lentamente a medida que pasan los años. El Municipio de El Dovio desde el año 2000, ha presentado un aumento en el desplazamiento, principalmente en los años 2007 y 2008, para el año 2015 presenta mayor número recepción que expulsión, aunque para las vigencias 2016 y prácticamente 2017, 2018 los datos por el concepto de recepción y expulsión se percibe una disminución y es considerable trayendo consigo el paz y tranquilidad al Municipio.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En este capítulo se realizará análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2016). El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

Las enfermedades del Sistema Circulatorio ocuparon el primer lugar con una tasa ajustada de 306,59. Le siguen las Neoplasias con una tasa de 200,56. Se debe resaltar el aumento progresivo de las Neoplasias.

Tabla 18. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Población General en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca 2005-2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO | 167,96 | 185,32 | 207,23 | 324,73 | 219,14 | 211,85 | 324,77 | 152,96 | 171,86 | 307,59 | 247,10 | 306,59 |
| NEOPLASIAS | 154,67 | 106,34 | 96,29 | 166,09 | 71,63 | 72,82 | 44,90 | 47,27 | 104,46 | 148,16 | 106,57 | 200,56 |
| TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES | 229,80 | 255,91 | 243,22 | 157,92 | 184,46 | 152,15 | 145,16 | 136,89 | 110,89 | 178,15 | 159,23 | 168,11 |
| CAUSAS EXTERNAS | 162,78 | 234,26 | 121,86 | 225,40 | 129,58 | 264,56 | 282,97 | 212,66 | 55,98 | 138,94 | 89,64 | 79,07 |
| ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 92,50 | 56,75 | 53,85 | 37,57 | 33,72 | 43,37 | 85,37 | 21,77 | 46,55 | 21,63 | 37,33 | 46,22 |
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 21,52 | 20,46 | 23,55 | 12,18 | 23,97 | 23,75 | 22,39 | 24,09 | 0,00 | 11,43 | 11,40 | 0,00 |

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas de Mortalidad Ajustada en Hombres


Se observa que las Enfermedades del Sistema Circulatorio son la principal causa de muerte según las tasas ajustadas en los hombres para el año 2016 (443,41).

Tabla 19. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Hombres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO | 159,97 | 197,04 | 262,13 | 289,09 | 263,45 | 210,24 | 418,43 | 117,08 | 224,32 | 351,63 | 283,48 | 443,41 |
| NEOPLASIAS | 150,62 | 136,04 | 69,78 | 156,94 | 95,75 | 27,16 | 23,32 | 71,74 | 109,51 | 256,85 | 123,64 | 213,78 |
| CAUSAS EXTERNAS | 256,24 | 440,58 | 224,43 | 402,08 | 238,66 | 449,61 | 481,48 | 325,14 | 88,93 | 235,50 | 136,47 | 160,92 |
| TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES | 262,09 | 287,21 | 227,36 | 163,32 | 142,40 | 155,43 | 157,53 | 135,90 | 88,49 | 167,75 | 204,28 | 158,21 |
| ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 183,53 | 62,52 | 61,32 | 46,86 | 45,72 | 64,88 | 76,60 | 43,77 | 48,18 | 22,97 | 49,45 | 93,65 |
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 16,62 | 22,10 | 47,05 | 0,00 | 25,17 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Tasa de Mortalidad Ajustada en Mujeres


Las Enfermedades Neoplasias son las de mayor incidencia en las Mujeres del Municipio (188,19) para el año 2016, seguida de Todas las Demás Enfermedades (175,14).

Tabla 20. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad en Mujeres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca 2005-2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NEOPLASIAS | 157,76 | 72,44 | 121,07 | 175,23 | 46,53 | 113,96 | 68,56 | 24,00 | 101,00 | 42,53 | 91,76 | 188,19 |
| TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES | 194,37 | 225,19 | 267,64 | 146,11 | 233,82 | 147,68 | 130,99 | 136,39 | 131,69 | 193,08 | 114,33 | 175,14 |
| ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO | 180,51 | 180,67 | 155,77 | 361,95 | 168,62 | 216,46 | 231,56 | 191,61 | 118,22 | 263,62 | 210,12 | 169,45 |
| CAUSAS EXTERNAS | 63,32 | 20,85 | 18,29 | 48,32 | 20,72 | 84,72 | 88,23 | 102,62 | 21,74 | 43,89 | 42,05 | 0,00 |
| ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 0,00 | 49,65 | 44,72 | 25,54 | 20,51 | 20,95 | 95,17 | 0,00 | 48,38 | 21,41 | 24,59 | 0,00 |
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 24,75 | 19,05 | 0,00 | 23,23 | 22,88 | 23,51 | 46,14 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.


Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de El Dovio, 2005 – 2016.



Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP

Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentará los datos estimados del indicador de Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP, se realizó comparación del comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2016) de la información. Este indicador permite analizar la magnitud de las muertes prematuras.

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas en hombres y mujeres del municipio El Dovio, 2005 a 2016.




Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

En relación a los AVPP de mortalidad por grandes causas en hombres se evidencia que en los años analizados las causas externas ocuparon el primer lugar.

Proporción de AVPP en hombres

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres – municipio El Dovio, 2005 a 2016




Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

En el caso del sexo femenino se encuentra que las neoplasias son las de mayor proporción de AVPP

Proporción de AVPP en mujeres

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP por grandes causas lista 6/67 en Mujeres municipio de El Dovio, 2005 a 2016.



La comparación entre hombres y mujeres con relación a las proporciones de AVPP, permite determinar que, a diferencia del sexo femenino, los hombres tienen una gran afectación de AVPP por causas externas, mientras que en las mujeres son las Neoplasias las que tienen mayor representación.

Tasas Ajustadas de los Años de Vida Potencialmente-Perdidos AVPP

Tabla 21. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Población General en el Municipio El Dovio-Valle del Cauca 2005-2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Neoplasias | 3.133,1 | 3.085,6 | 1.549,1 | 2.482,7 | 975,4 | 1.379,1 | 1.210,8 | 744,5 | 2.740,0 | 3.403,3 | 2.984,5 | 4.409,6 |
| Enfermedades | 2.896,2 | 2.495,2 | 3.552,2 | 5.602,0 | 3.029,1 | 2.444,5 | 3.521,3 | 1.894,2 | 2.441,2 | 3.434,4 | 4.013,5 | 3.713,0 |
| sistema circulatorio | | | | | | | | | | | | |
| Las demás causas | 6.445,6 | 5.825,6 | 4.040,1 | 4.807,3 | 5.313,7 | 2.530,2 | 3.859,6 | 3.983,3 | 1.437,9 | 3.400,9 | 6.539,4 | 2.926,8 |
| Causas externas | 7.247,5 | 10.976,3 | 4.662,6 | 10.898,0 | 6.398,5 | 12.135,5 | 11.572,6 | 9.170,5 | 2.130,2 | 5.255,0 | 5.391,2 | 2.748,5 |
| Enfermedades transmisibles | 3.132,4 | 1.525,2 | 3.191,6 | 1.446,3 | 1.800,6 | 1.902,4 | 2.144,7 | 463,6 | 850,9 | 479,8 | 1.054,8 | 2.302,4 |
| Signos y síntomas mal definidos | 737,4 | 1.408,1 | 188,9 | 55,3 | 108,1 | 404,4 | 428,7 | 492,4 | 0,00 | 327,4 | 309,0 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67. Hombres y mujeres El Dovio, 2005 – 2016




Tabla 22. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Hombres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca 2005-2016

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Enfermedades sistema circulatorio | 3.590,5 | 2.825,1 | 4.968,2 | 4.376,6 | 4.618,0 | 2.409,2 | 4.633,5 | 1.676,1 | 3.019,2 | 4.350,5 | 4.746,0 | 6.218,9 |
| Causas externas | 11.062,2 | 20.768,4 | 8.199,3 | 20.334,9 | 11.898,3 | 19.617,4 | 18.603,5 | 14.356,0 | 3.519,5 | 8.224,6 | 8.176,6 | 5.520,9 |
| Enfermedades transmisibles | 6.115,3 | 2.433,7 | 4.089,1 | 1.550,3 | 1.937,7 | 2.073,4 | 1.859,3 | 956,4 | 1.045,2 | 766,6 | 1.084,9 | 4.572,3 |
| Neoplasias | 3.343,7 | 4.013,1 | 1.313,3 | 2.207,9 | 1.266,4 | 422,0 | 778,4 | 957,7 | 4.012,4 | 5.857,5 | 3.869,7 | 3.543,6 |
| Las demás causas | 8.349,5 | 7.516,8 | 2.425,8 | 6.566,7 | 2.274,5 | 2.815,2 | 2.933,4 | 2.803,0 | 1.698,3 | 3.899,5 | 7.066,5 | 2.696,1 |
| Signos y síntomas mal definidos | 1.294,9 | 1.280,6 | 369,5 | 0,00 | 112,8 | 465,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,1 | 0,00 | 0,00 |

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en Hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016





Tabla 23. Tasa de AVPP por Grandes Causas lista 6/67 en Mujeres en el Municipio El Dovio- Valle del Cauca 2005-2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Neoplasias | 2.937,40 | 2.025,30 | 1.784,00 | 2.817,40 | 662,5 | 2.277,20 | 1.674,10 | 543,2 | 1.467,80 | 994,5 | 2.176,50 | 5.310,50 |
| Las demás causas | 4.373,10 | 3.936,40 | 5.755,10 | 2.768,30 | 8.503,60 | 2.220,20 | 4.781,10 | 5.167,00 | 1.158,00 | 2.960,00 | 5.964,60 | 3.030,60 |
| Enfermedades sistema circulatorio | 2.224,60 | 2.245,70 | 2.145,50 | 6.842,50 | 1.320,10 | 2.505,80 | 2.392,00 | 2.156,40 | 1.861,70 | 2.576,40 | 3.243,30 | 1.223,70 |
| Causas externas | 3.212,00 | 857,6 | 1.199,20 | 1.356,40 | 852,2 | 4.784,20 | 4.673,80 | 4.009,10 | 688,8 | 2.260,30 | 2.549,00 | 0,00 |
| Enfermedades transmisibles | 0,00 | 574 | 2.179,90 | 1.297,90 | 1.648,50 | 1.725,50 | 2.462,70 | 0,00 | 718,5 | 226,7 | 1.011,20 | 0,00 |
| Signos y síntomas mal definidos | 112,4 | 1.571,00 | 0,00 | 105,5 | 103,9 | 334,8 | 875,8 | 990,8 | 0,00 | 0,00 | 595,7 | 0,00 |

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en Mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.


2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

Ahora, se realizará un análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. SISPRO.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Dovio 2005-2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Infecciones respiratorias agudas | 43,11 | 23,69 | 17,94 | 25,75 | 45,72 | 0,00 | 51,42 | 20,54 | 23,59 | 0,00 | 26,31 | 71,94 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 43,11 | 17,37 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | 21,72 |
| Tuberculosis | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meningitis | 24,08 | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Septicemia, excepto neonatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 45,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 23,23 | 0,00 | 22,97 | 23,14 | 0,00 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

80,00 70,00 -Enfermedad por el VIH (SIDA) Tasas ajustadas por 100.000 habitantes -Enfermedades infecciosas 60,00 intestinales -Tuberculosis 50,00 -Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 40,00 Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 30,00 -Meningitis 20,00 Septicemia, excepto neonatal Infecciones respiratorias agudas 10,00 Resto de ciertas enfermedades 0.00 infecciosas y parasitarias 2009 2010 2012 2013 2014 2006 2011 2015 2007 Año de defunción Área del gráfico

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,59 | 0,00 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuberculosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meningitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Septicemia, excepto neonatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infecciones respiratorias agudas | 0,00 | 49,65 | 22,83 | 0,00 | 20,51 | 20,95 | 75,70 | 0,00 | 48,38 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70,00 Infecciones respiratorias agudas 60,00 Tasas ajustadas por 100.000 habitantes Enfermedades infecciosas intestinales 50,00 -Tuberculosis 40,00 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia Ciertas enfermedades 30,00 inmunoprevenibles Meningitis 20,00 Septicemia, excepto neonatal 10,00 Enfermedad por el VIH (SIDA)

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 - 2016

2007 2008 2010

2012

2011 Año de defunción 2014 2015

0,00

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 - 2016.


Resto de ciertas enfermedades

infecciosas y parasitarias

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Infecciones respiratorias agudas | 21,52 | 36,28 | 20,5 | 13 | 33,72 | 10,17 | 63,13 | 10,7 | 34,69 | 10,63 | 13,48 | 35,12 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 21,52 | 9,09 | 9,38 | 0 | 0 | 10,17 | 0 | 0 | 11,85 | 0 | 0 | 11,1 |
| Tuberculosis | 14,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 0 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis | 12,04 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia, excepto neonatal | 0 | 0 | 0 | 11,69 | 0 | 11,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 22,95 | 0 | 11,37 | 12,88 | 0 | 0 | 12,71 | 11,06 | 0 | 11 | 23,85 | 0 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neoplasias

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. SISPRO.

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 0,00 | 24,86 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,47 | 23,70 | 48,99 |
| Tumor maligno de la próstata | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 49,90 | 0,00 | 48,34 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 43,43 | 26,96 | 44,91 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,82 |
| Tumor maligno del estómago | 42,91 | 23,68 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 23,97 |
| Leucemia | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05 | 23,05 | 0,00 | 23,97 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 22,97 | 0,00 | 22,68 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 21,41 | 17,37 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 23,97 | 20,54 | 46,91 | 52,16 | 0,00 |
| Tumores insitu, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 23,70 | 0,00 |

60,00 ·Tumor maligno del estómago -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoide 50,00 Tumor maligno de los órganos digestivos y del perito excepto estómago y colon Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulm Tasas ajustadas por 100.000 habitantes 20,000 20,00 l'umor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón Tumor maligno de la mama de la mujer Tumor maligno del cuello del útero -Tumor maligno del cuerpo del útero -Tumor maligno del útero, parte no especificada -Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 10,00 -Tumor maliono del tejido linfático, de otros órganos

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

0,00

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de El Dovio, 2005 – 2016.

de defunción

2013

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 25,71 | 27,14 | 23,76 | 46,49 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 0,00 | 27,39 | 25,28 |
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 0,00 | 24,08 | 23,45 | 0,00 | 46,53 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 22,68 |
| Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 21,12 | 21,41 | 26,95 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97 | 22,68 |
| Tumor maligno del estómago | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 24,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 |
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 24,67 | 0,00 | 23,59 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del cuello del útero | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 0,00 | 21,22 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leucemia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Área de trazado s y de tejidos afines rumores mangros de otras localizaciones y de las no

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto

especificadas

o desconocido

60,00 -Tumor maligno de la próstata +Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 50,00 Tasas ajustadas por 100.000 habitantes Tumor maligno del cuello del útero Tumor maligno de la mama de la mujer Tumor maligno del útero, parte no especificada Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido ·Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines Tumor maligno del estómago 10,00 Tumor maligno de los órganos respira de SY ENGERO rácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón Tumor maligno del cuerpo del útero 0,00 2009 2010 2011 2012 2005 Tumor maligno de otros órganos genitourinarios Año de defunción

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016


Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres y mujeres de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumor maligno de la próstata | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 49,90 | 0,00 | 48,34 |
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 11,89 | 12,59 | 25,15 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 11,40 | 36,06 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 22,04 | 14,25 | 23,00 | 11,69 | 11,79 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 33,77 |
| Tumor maligno del cuello del útero | 30,74 | 0,00 | 26,67 | 50,54 | 0,00 | 22,47 | 47,16 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 0,00 | 24,08 | 23,45 | 0,00 | 46,53 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 22,68 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
| Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 22,48 | 22,11 | 13,31 |
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 24,40 | 21,15 | 11,28 | 46,78 | 0,00 | 11,57 | 11,12 | 11,44 | 23,48 | 22,86 | 39,28 | 12,44 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 11,00 | 0,00 | 11,34 |
| Tumor maligno del estómago | 34,53 | 12,23 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 11,61 | 12,92 | 10,63 | 0,00 | 11,31 |
| Leucemia | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 11,68 | 0,00 | 11,31 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 0,00 | 10,78 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 12,49 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Enfermedades del sistema circulatorio

El Municipio de El Dovio para los 12 años de análisis presenta un alto porcentaje para las enfermedades Isquémicas del Corazón especialmente para el género masculino para el año 2016, por consiguiente el género femenino presenta una disminución, en tanto para las enfermedades Cerebrovasculares pasa por la misma situación se observa un aumento en los hombres y una reducción para las mujeres para el año 2106.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. SISPRO.

No se presentaron casos de muerte por: Paro cardíaco, Aterosclerosis

Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 99,37 | 52,07 | 222,48 | 96,91 | 147,58 | 68,69 | 141,23 | 47,18 | 89,55 | 283,47 | 164,02 | 327,48 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 16,77 | 73,54 | 17,94 | 47,15 | 0,00 | 22,98 | 24,75 | 23,97 | 43,87 | 21,11 | 50,39 | 71,87 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la | | | | | | | | | | | | |
| circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 67,32 | 52,32 | 0,00 | 22,96 | 23,59 | 0,00 | 21,35 | 44,06 |
| corazón | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades hipertensivas | 0,00 | 47,75 | 21,71 | 51,19 | 21,88 | 45,71 | 199,11 | 0,00 | 43,22 | 47,05 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiencia cardíaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 23,68 | 0,00 | 49,18 | 26,67 | 20,54 | 26,67 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 26,31 | 0,00 |

250,00 - Enfermedades isquémicas del corazón -Enfermedades cerebrovasculares -Enfermedades hipertensivas -Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón -Paro cardíaco Insuficiencia cardíaca -Aterosclerosis 0,00 Las demás enfermedades del sistema Año de defunción 2013

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en Mujeres del municipio de El Dovio, 2005 - 2016.

2005

2007

Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 - 2016.

circulatorio

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 76,73 | 81,43 | 99,79 | 96,76 | 97,94 | 115,85 | 135,44 | 66,12 | 48,24 | 200,26 | 116,94 | 85,36 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 49,50 | 24,35 | 27,14 | 69,09 | 0,00 | 100,61 | 44,89 | 49,81 | 0,00 | 41,94 | 93,18 | 42,71 |
| Enfermedades hipertensivas | 27,14 | 24,29 | 0,00 | 122,05 | 47,80 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 41,37 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón | 0,00 | 25,30 | 28,84 | 74,05 | 22,88 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 21,74 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiencia cardiaca | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, donde sobresalen las enfermedades hipertensivas, 2005-2016.





Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 87,49 | 61,36 | 160,00 | 96,25 | 124,94 | 92,45 | 138,70 | 56,63 | 69,39 | 241,59 | 139,87 | 205,43 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 33,65 | 51,23 | 21,44 | 60,40 | 0,00 | 59,43 | 34,19 | 36,27 | 22,07 | 32,84 | 72,13 | 57,40 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón | 22,88 | 12,23 | 13,73 | 48,33 | 45,63 | 26,05 | 11,71 | 11,74 | 22,69 | 10,63 | 10,92 | 22,03 |
| Enfermedades hipertensivas | 11,97 | 36,04 | 12,06 | 82,81 | 34,60 | 22,90 | 112,38 | 0,00 | 33,41 | 22,54 | 0,00 | 21,73 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiencia cardíaca | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 25,13 | 12,87 | 0,00 | 10,70 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 24,46 | 0,00 | 25,27 | 13,96 | 11,01 | 13,90 | 12,49 | 11,43 | 0,00 | 13,48 | 0,00 |

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

100% ■ Resto de ciertas afecciones 90% originadas en el período perinatal 80% Sepsis bacteriana del recién nacido 70% ■ Trastornos respiratorios 60% Defunciones específicos del período perinatal 50% Retardo del crecimiento fetal, 40% desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer 30% ■ Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 20% y traumatismo del nacimiento ■ Feto y recién nacido afectados 10% por ciertas afecciones maternas 0% 2010 2012 2006 Año de defunción

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

100% Resto de ciertas afecciones 90% originadas en el período perinatal 80% Sepsis bacteriana del recién 70% nacido Defunciones 60% Trastornos respiratorios 50% específicos del período perinatal 40% Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación 30% corta y bajo peso al nacer 20% ■ Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 10% y traumatismo del nacimiento 0% ■ Feto y recién nacido afectados 2011 por ciertas afecciones maternas Año de defunción

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres y muieres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en El Dovio, es 0% ocurren por ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el Valle del Cauca (27,44%). Figura 27

120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 60,00 40,00 33.33 29,17 28,19 27,44 25,36 22,26 21,63 21,29 20,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EL DOVIO VALLE

Figura 26. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Dovio, 2005 - 2016

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en El Dovio, es 0% ocurren por trastornos específicos del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total del Valle del Cauca (35,02%).

50 44.49 43.48 43,04 45 40,32 39.57 38,17 38,32 37,77 40 35 30 25 20 15 ,11 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VALE EL DOVIO

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Causas externas

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.




Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombre del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Accidentes de transporte terrestre | 22,42 | 46,96 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 23,87 | 37,40 | 26,98 | 0,00 | 23,59 | 41,95 | 71,18 |
| Las demás causas externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 |
| Agresiones (homicidios) | 186,79 | 348,72 | 157,81 | 376,33 | 238,66 | 407,80 | 335,38 | 298,16 | 88,93 | 211,90 | 0,00 | 44,30 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caídas | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Los demás accidentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 0,00 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 |
| Eventos de intención no determinada | 47,03 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.




Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Accidentes de transporte terrestre | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 27,66 | 20,72 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 22,77 | 21,02 | 0,00 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caídas | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Los demás accidentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 20,66 | 0,00 | 18,82 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,02 | 0,00 |
| Agresiones (homicidios) | 22,79 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | 67,42 | 102,62 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 0,00 |
| Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Las demás causas externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

250,00 -Accidentes de transporte terrestre Agresiones (homicidios) -Las demás causas externas -Los demás accidentes de transporte y los no especificados -Caidas -Accidentes por disparo de arma de fuego -Ahogamiento y sumersión accidentales -Accidentes que obstruyen la respiración -Exposición a la corriente eléctrica Exposición al humo, fuego y llamas Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas Los demás accidentes 0,00 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2012 2014 2010 2016 2013 2015 2009 2011 Eventos de intención no determinada Año de defunción


Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Accidentes de transporte terrestre | 22,95 | 23,96 | 0 | 26,39 | 10,72 | 22,41 | 19,08 | 13,19 | 11,43 | 22,31 | 31,73 | 34,7 |
| Agresiones (homicidios) | 108,04 | 187,03 | 77,69 | 188,29 | 118,86 | 223,78 | 198,87 | 199,47 | 44,56 | 116,63 | 0 | 22,26 |
| Las demás causas externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,11 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caídas | 7,87 | 23,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,35 | 0 | 0 | 0 | 10,41 | 0 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 0 | | 12,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los demás accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 25,32 | 0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 0 | 0 | 8,83 | 10,72 | 0 | 18,37 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 22,19 | 0 |
| Eventos de intención no determinada | 23,93 | 0 | 23,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Todas las demás enfermedades

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 77,06 | 21,71 | 76,78 | 0 | 47,05 | 85,32 | 24,75 | 23,97 | 0 | 24,19 | 0 | 22,95 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 22,22 | 0 | 0 | 21,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,88 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 0 | 16,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 22,88 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 49,87 | 23,68 | 50,47 | 0 | 0 | 0 | 66,94 | 45,1 | 23,59 | 23,59 | 23,23 | 22,88 |
| Enfermedades del sistema urinario | 0 | 44,91 | 24,87 | 0 | 25,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,18 | 47,72 | 22,88 |
| Diabetes mellitus | 89,5 | 0 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 51,2 | 0 | 22,03 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0 | 52,12 | 0 | 36,92 | 0 | 0 | 0 | 20,56 | 0 | 0 | 64,05 | 21,72 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 36,92 | 0 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 0 | 26,03 | 0 | 25,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 21,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 0 | 78,1 | 49,05 | 0 | 48,3 | 0 | 20,54 | 0 | 44,35 | 23,59 | 26,47 | 0 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de las enfermedades | 0 | 23,68 | 0 | 42,78 | 0 | 50,33 | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 42,82 | 0 |

120,00 Resto de enfermedades del sistema -Enfermedades del sistema urinario 100,00 Tasas ajustadas por 100.000 habitantes 00.009 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado Diabetes mellitus Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales Resto de las enfermedades 20,00 Trastornos mentales y del comportamiento Enfermedades del sistema nervioso, 0.00 excepto meningitis 2010 2012 2011

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 40. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Año de defunción

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diabetes mellitus | 24,75 | 75,78 | 100,55 | 45,77 | 0,00 | 47,70 | 44,89 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | 42,43 | 20,68 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 0,00 | 0,00 | 70,95 | 49,44 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 63,79 | 0,00 | 21,88 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 21,12 | 0,00 | 27,63 | 0,00 | 0,00 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 21,88 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 48,44 | 50,70 | 0,00 | 26,15 | 29,60 | 21,25 | 27,92 | 21,71 | 55,25 | 24,59 | 46,03 |
| Enfermedades del sistema urinario | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 27,66 | 24,92 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31 |
| Embarazo, parto y puerperio | 24,08 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 21,25 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 0,00 |
| Resto de las enfermedades | 50,46 | 51,50 | 27,14 | 23,23 | 49,22 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 23,49 | 20,68 |

--- Resto de enfermedades del sistema 80,00 digestivo Enfermedades crónicas de las vías 70,00 respiratorias inferiores -Enfermedades del sistema urinario 60,00 Tasas ajustadas por 100.000 habitantes Diabetes mellitus 50,00 Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 40,00 -Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas -Deficiencias nutricionales y anemias 30,00 nutricionales Trastomos mentales y del 20,00 comportamiento -Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 10,00 -Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,00 Resto de las enfermedades 2014 2012 2013 2015 2005 2016 2011 Año de defunción

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 41. Mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 62,21 | 49,18 | 0,00 | 37,56 | 14,16 | 21,13 | 13,39 | 32,40 | 38,05 | 25,49 | 24,02 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 38,02 | 12,06 | 72,66 | 23,87 | 45,95 | 45,28 | 11,71 | 11,44 | 22,54 | 43,79 | 0,00 | 22,97 |
| Enfermedades del sistema urinario | 11,51 | 23,27 | 12,87 | 13,39 | 23,33 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 24,18 | 22,43 |
| Diabetes mellitus | 59,78 | 36,04 | 62,47 | 23,26 | 0,00 | 22,74 | 33,27 | 21,41 | 10,56 | 25,43 | 21,11 | 21,88 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 12,04 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 11,40 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 27,26 | 0,00 | 19,22 | 8,96 | 0,00 | 10,35 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 11,10 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 10,15 | 10,17 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 0,00 | 8,83 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 26,16 | 12,23 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | 34,25 | 11,27 | 24,58 | 11,02 | 10,86 |
| Resto de las enfermedades | 25,23 | 36,88 | 12,06 | 35,09 | 25,05 | 59,80 | 11,71 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 32,87 | 10,86 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 24,77 | 12,58 | 0,00 | 12,18 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hiperplasia de la próstata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Embarazo, parto y puerperio | 12,04 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Tabla 42. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 16,62 | 22,10 | 47,05 | 0,00 | 25,17 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 24,75 | 19,05 | 0,00 | 23,23 | 22,88 | 23,51 | 46,14 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |

Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.



Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres y mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 21,52 | 20,46 | 23,55 | 12,18 | 23,97 | 23,75 | 22,39 | 24,09 | 0,00 | 11,43 | 11,40 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

Plan Decenal De Salud Pública

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se hace un análisis de tendencia.

Para realizar el monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se hace un análisis de desigualdad relativa. Teniendo en cuenta que, para el ASIS, es importante identificar las diferencias que causan inequidad sanitaria, se calcularon cocientes de tasas para los indicadores definidos, dividiendo el valor que toma cada indicador en el Departamento del Valle entre el valor de referencia del país.

Ante la posibilidad de que pequeñas diferencias puedan clasificar erróneamente al Departamento, se procedió al cálculo de intervalos de confianza al 95% para identificar aquellos indicadores que se encuentran significativamente en peor o mejor situación con respecto al País utilizando el método de Rothman KJ y Greenland S (Rothman KJ, 1998) y la correspondiente semaforización.

En el municipio de El Dovio los indicadores propuestos para el semáforo del Plan Decenal de Salud, que presentan un valor estadísticamente más alto que el departamento del Valle del Cauca, con relación a las tasas ajustadas son: Accidentes de transporte, tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno de la próstata, trastornos metales y del comportamiento.

Tabla 45. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Dovio, 2006-2016.

| | VALLE DEL | | | | | | Com | port | amie | ento | | | |
|--|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| Causa de muerte | CAUCA | EL DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre | 19,43 | 34,70 | 7 | ٧ | 7 | ٧ | 7 | ٧ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama | 15,68 | 22,68 | 7 | 7 | ٧ | 7 | ٧ | ٧ | - | - | - | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino | 7,02 | 25,35 | 7 | 7 | 7 | V | 7 | 7 | \ | 7 | ٧ | - | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata | 17,45 | 48,34 | 7 | - | 7 | ٧ | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago | 10,37 | 11,31 | 7 | ٧ | 7 | ٧ | - | 7 | 7 | 7 | ٧ | ٧ | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus | 16,82 | 21,88 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ٧ | ٧ | 7 | ٧ | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente | 4,48 | 0,00 | - | 7 | 7 | ٧ | 7 | 7 | ¥ | - | - | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento | 2,73 | 10,86 | 'n | - | 7 | ٧ | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) | 50,01 | 22,26 | , | ٧ | 7 | ٧ | 7 | ٧ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad específica por edad por malaria | 0,09 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles | 38,98 | 46,22 | 7 | ٧ | ٧ | ٧ | 7 | 7 | ٧ | 7 | ٧ | 7 | 7 |
| Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza | 0,19 | 0,00 | - | - | - | _ | _ | | - | - | _ | | - |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

Tabla 46. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Dovio, 2006-2016.

| Causa de Muerte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 49,90 | 0,00 | 48,34 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles | 92,50 | 56,75 | 53,85 | 37,57 | 33,72 | 43,37 | 85,37 | 21,77 | 46,55 | 21,63 | 37,33 | 46,22 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre | 22,95 | 23,96 | 0,00 | 26,39 | 10,72 | 22,41 | 19,08 | 13,19 | 11,43 | 22,31 | 31,73 | 34,70 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino | 30,74 | 0,00 | 26,67 | 50,54 | 0,00 | 22,47 | 47,16 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama | 0,00 | 24,08 | 23,45 | 0,00 | 46,53 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 22,68 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) | 108,04 | 187,03 | 77,69 | 188,29 | 118,86 | 223,78 | 198,87 | 199,47 | 44,56 | 116,63 | 0,00 | 22,26 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus | 59,78 | 36,04 | 62,47 | 23,26 | 0,00 | 22,74 | 33,27 | 21,41 | 10,56 | 25,43 | 21,11 | 21,88 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago | 34,53 | 12,23 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 11,61 | 12,92 | 10,63 | 0,00 | 11,31 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 10,72 | 0,00 | 18,37 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad específica por edad por malaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO.

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres menores de 1 año son las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor incidencia, seguida de las enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 47. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | | | | | | Hom | bres | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 10,10 | 8,62 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 40,40 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 1 3,16 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 10,10 | 8,62 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 24,10 | 41,67 | 16,13 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 32,26 | 15,87 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Para mujeres menores de 1 año son las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor incidencia.

Tabla 48. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | | | | | | Muje | res | | | | | |
|--|------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 ,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 8,70 | 0,00 | 12, 50 | 19,23 | 14, 08 | 28,57 | 15 ,15 | 15 ,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 ,15 | 15 ,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabla 49. Tasa de Mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| | | | | | | To | otal | | | | | |
|--|------|--------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 4,67 | 4,46 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | ### | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 6,80 | 7,19 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 9,35 | 4,46 | 11,90 | 8,77 | 6,80 | 14,39 | 7,75 | 24,00 | 13,89 | 20,83 | 9,43 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 8, 93 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 7,87 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | _ | _ | | | | | | | | | | |

Para hombres menores de 1 a 4 años son las Causas externas de morbilidad y mortalidad las de mayor incidencia.

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 50. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 100.000 menores de 1 a 4 años, según grandes grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad | | | | | | Hombre | s | | | | | 1 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 257,73 | 0,00 | 271,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas | 0,00 | 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 237,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 0,00 |

En las mujeres menores de 1 a 4 años se presentaron tres grupos de muertes, en primer lugar las enfermedades del sistema digestivo en el año 2011 (298,51) en segundo lugar las Enfermedades del sistema Respiratorio en el año 2009 (291,55) y en tercer lugar las Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas en el año 2005 alcanzaron una tasa de (262,47).

Tabla 51. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 100.000 menores de 1 a 4 años, según grandes grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad | | | | | | Mujeres | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|--------|---------|--------|------|------|------|------|------|
| infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 52. Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 100.000 menores de 1 a 4 años, según grandes grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad | | | | | | Total | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 124,69 | 0,00 | 0,00 | 275,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 134,41 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 |
| Signos, sintomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 |

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

En los hombres menores de 5 años son también las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor riesgo y alcanzaron su mayor incidencia en el año 2014 (714,29), después son las enfermedades del sistema respiratorio, su mayor incidencia 2005 (750,47), luego están las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, su mayor incidencia fue en el año 2015 (722,89).

Tabla 53. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años, según grandes grupos (Hombres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| Causa de muerte según lista de tabulación para la | | | | | | Hom | bres | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 187,62 | 196,08 | 202,43 | 0,00 | 0,00 | 223,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 <mark>6,</mark> 67 | 0,00 | 223,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 202,43 | 0,00 | 215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,96 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 750,47 | 0,00 | 202,43 | 0,00 | 215,05 | 0,00 | 227,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,10 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 187,62 | 196,08 | 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,04 | 469,48 | 714,29 | 240,96 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 588,24 | 0,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 2,02 | 0,00 | 0,00 | 722,89 | 245,10 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,96 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

En las mujeres menores de 5 años se destacan las afecciones originadas en el periodo perinatal, que alcanzaron su mayor incidencia en el año 2010 (472,81) y la incidencia más baja en el 2005 (207,04). La tendencia general en el periodo, aunque es fluctuante, se observa que en el último quinquenio (2009 – 2013). El segundo grupo de eventos con mayor incidencia para las mujeres menores de 5 años son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que alcanzaron su pico máximo en el año 2012 (243,31).

Tabla 54. tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años, según grandes grupos (Mujeres) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| Causa de muerte según lista de tabulación para la | | | | | | Mujeres | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos | | | | | | | | | | | | |
| hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y | 207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,48 | 236,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 207,04 | 0,00 | 221,73 | 226,24 | 231,48 | 472,81 | 239,81 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,81 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| anomalías cromosómicas | | | | | | | | | | | | |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de | 0,00 | 215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| laboratorio | | | | | | | | | | | | |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabla 55. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años, según grandes grupos (Ambos Sexos) del municipio de El Dovio, 2005 – 2016.

| Causa de muerte según lista de tabulación para la | | | | | | То | tal | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mortalidad infantil y del niño | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 98,43 | 102,56 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos | | | | | | | | | | | | |
| hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 216,92 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 111,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 393,70 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 222,97 | 114,81 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,31 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 196,85 | 102,56 | 211,64 | 108,46 | 111,48 | 229,62 | 116,82 | 356,29 | 240,38 | 365,41 | 123,30 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y | 0,00 | 307,69 | 0,00 | 216,92 | 0,00 | 0,00 | 116,82 | 237,53 | 0,00 | 0,00 | 369,91 | 125,31 |
| anomalías cromosómicas | | | | | | | | | | | | |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de | 98,43 | 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| laboratorio | | | | | | | | | | | | |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 0,00 |

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportaran el número de muertes, además la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

Por todas las causas según la lista 67

El análisis de la incidencia de mortalidad por todas las causas y para los dos sexos permite observar que el mayor indicador de muerte en los primer año del análisis se debe a las enfermedades del sistema respiratorio años 2005 (4) muertes, al contrario de los últimos tres años que la mayor causa de muerte en la población menor de 5 años son las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal un total (19) muertes en los trece años de análisis y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas un total de (13) muertes. (P00 y P96)

Las otras causas de muertes en esta población se presentaron muy esporádicamente entre los años evaluados.

Tabla 56. Casos de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas El Dovio, 2005 – 2017

| Grandes causas de muerte | Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | 01 - DIARREA Y | NO | De 0 a antes de 1 año | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | GASTROENTERITIS DE PRESUNTO | MASCULINO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | ORIGEN INFECCIOSO | MA | Menores 5 años | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ENF O | | Total | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Total | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | ONI | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02 - TUMORES (NEOPLASIAS) | 02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS | MASCULINO | Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02 - NEC | | Total | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ADES S, S Y | | NO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS | FEMENINO | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NDO NDO RICK | DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 - E E NUT | | MASC | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Grandes causas de muerte | Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Total | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DEL | 04 | ONI: | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA | MASCULINO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RMED | CIRCULATORIO | W | Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EMA | | Total | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 07 - E | Total | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | NO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | FEMENINO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | ш | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TORIO | 01 - NEUMONÍA | CINO | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RESPIRA | | MASCULINO | Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| IEMA | | Total | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| EL SIST | 02 - OTRAS | CINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ERME | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 - ENF | 03 - RESTO DE ENFERMEDADES | MASCULINO | De 0 a antes de 1 año | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | DEL SISTEMA RESPIRATORIO | M/ | Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | Total | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Total | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| ES DEL | 01 - | ONII | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | FEMENINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENFE | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - 60 S | Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Grandes causas de muerte | Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 01 - FETO Y RECIEN | FEMENINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | NACIDO AFECTADO POR FACTORES | | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | MATERNOS Y POR COMPLICACIONES | ILINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | DEL EMBARAZO | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 05 - DIFICULTAD | MASCULINO | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RINATAI | RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | MAS | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O PEF | | Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ERIOD | | NO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL | 06 - NEUMONÍA CONGÉNITA | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IGINA | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IES OR | | ONI | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AFECCION | 07 - OTRAS AFECCIONES | FEMENINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ERTAS | RESPIRATORIAS DEL RECIEN | ONI: | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 - CI | NACIDO | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | NO | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | FEMENINO | Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO | ONI | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | MASCULINO | Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| Grandes causas de muerte | Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL | MASCULINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | RECIEN NACIDO | _ | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | ONI | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 11 - RESTO DE | FEMENINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | AFECCIONES PERINATALES | ONI | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | Total | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| ILÍAS | 0.2 | ONI: | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ANOMA | 03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL | MASCULINO | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ' X S | CORAZÓN | M | Total | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| DADE | | Total | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL | FEMENINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MOS | SISTEMA CIRCULATORIO | 4 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ONG | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| NES C | | ONI: | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| MACIO | 06 - OTRAS MALFORMACIONES | MASCULINO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LFOR | CONGÉNITAS | W | Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| - MA | | Total | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | Total | | | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| S INICOS | | ONI | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SINTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS | 01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL | FEMENINO | Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANO | | Total | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Grandes causas de muerte | Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---|---|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE | MASCULINO | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | LABORATORIO | | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | ONI | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALIDAD | 01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE | MASCULINO | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MORT | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ILIDAD Y N | 02 - AHOGAMIENTO | MASCULINO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E MORB | Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES | MASC | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IAS D | | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD | 05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y | MASCULINO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 - CA | EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS | M | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | NOCIVAS | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Total | | | | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 63 |

Hombres

Se presentaron en total 46 muertes en todo el periodo de estudio, es decir 3,5 casos por año, los años con mayor incidencia está 2005 (7) casos, 2006 (6) casos y 2015 (6) casos.

Tabla 57. Número de muertes en hombres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas municipio El Dovio, 2005 – 2017

| Grandes causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 01 - CIERTAS ENFERMEDADES | De 0 a antes de 1 año | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Menores 5 años | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02 - TUMORES (NEOPLASIAS) | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 - ENFERMEDADES | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| METABÓLICAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07 FNEEDMED ADEO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESPIRATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - CIERTAS AFECCIONES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL | Menores 5 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | De 01 a 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | años Menores 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | años De 0 a antes de | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Menores 5 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 40 MALEODMA OLONEO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORTALIDAD | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 46 |

Se observa para estos subgrupos de causas en menores de 5 años que las otras malas formaciones congénitas son las de mayor incidencia con un total de (6) casos, seguida de la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosos con (4) casos respectivamente y la neumonía con la misma cantidad de casos.

Tabla 58. Número de muertes en hombres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 subgrupos de causas municipio El Dovio, 2005 – 2017.

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| a. Dupper V | De 0 a antes de 1 año | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | Menores 5 años | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| a. promitpiolón v | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NUTRICIONALES | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04 FNEEDMEDADEO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CIRCULATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 01 – NEUMONÍA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 02 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INFECCIONES RESPIRATORIAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUDAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03 - RESTO DE | De 0 a antes de 1 año | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESPIRATORIO | Menores 5 años | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGESTIVO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| POR FACTORES MATERNOS Y POR | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO | Menores 5 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIEN NACIDO | Menores 5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06 - NEUMONÍA CONGÉNITA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIEN NACIDO | Menores 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | años | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 05000 | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIEN NAGIDO | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 - TRASTORNOS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIEN NACIDO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - RESTO DE | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFECCIONES PERINATALES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMIATALEO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03 - | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL | De 01 a 04 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CORAZÓN | Menores 5 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 04 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SISTEMA CIRCULATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONGENITAS | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFANTIL | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - OTROS | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO | Menores 5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02 - AHOGAMIENTO Y | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMERSIÓN ACCIDENTALES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 - ENVENENAMIENTO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSTANCIAS NOCIVAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 46 |

Mujeres

Se presentaron en total 17 muertes en todo el periodo de estudio, es decir 1,3 muertes por año, los menores de 5 años, grupo denominado Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) son las de mayor aporte en los años 2005, 2007 y 2008, luego encontramos las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y las enfermedades del sistema respiratorio

Tabla 59. Número de muertes en mujeres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas municipio El Dovio, 2005 – 2017.

| Grandes causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - CIERTAS ENFERMEDADES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - TUMORES (NEOPLASIAS) | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Grandes causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Menores 5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OZ ENEEDMEDADEO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESPIRATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIOLOTIVO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 - CIERTAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Grandes causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - MALFORMACIONES | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROMOSÓMICAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Grandes causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - CAUSAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNAS DE MORBILIDAD Y | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORTALIDAD | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |

De los 17 casos identificados en muerte de mujeres en la infancia y niñez en menores de 5 años, encontramos que estas son ocasionadas por otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio y las sepsis bacteriana del recién nacido, luego encontramos la desnutrición y otras deficiencias nutricionales, la neumonía y feto recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo. Los años con mayor incidencia fueron 2011, 2012 y 2013.

Tabla 60. Número de muertes en mujeres en la infancia y niñez, según la lista de las 67 subgrupos de causas municipio El Dovio, 2005 – 2017.

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01 - DIARREA Y | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIOSO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | De 01 a 04 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOTITION ILLO | Menores 5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| od ENEEDMEDADEO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 – NEUMONÍA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIONES RESPIRATORIAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUDAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - RESTO DE | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESPIRATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - ENFERMEDADES | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEL SISTEMA DIGESTIVO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POR FACTORES MATERNOS Y POR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DEL EMBARAZO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 - DIFICULTAD | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - NEUMONÍA CONGÉNITA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - OTRAS AFECCIONES | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 050010 | De 0 a antes de 1 año | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NESIEN WIGIDS | Menores 5 años | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 - TRASTORNOS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACIDO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERINATALES | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONAZON | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - OTRAS | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRCULATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONGENITAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , | De 0 a antes de 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFANTIL | Menores 5 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02 - OTROS SÍNTOMAS, | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DE LABORATORIO | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - ACCIDENTES DE | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSPORTE | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Subgrupo de causas de muerte | Edad | Muertes 2005 | Muertes 2006 | Muertes 2007 | Muertes 2008 | Muertes 2009 | Muertes 2010 | Muertes 2011 | Muertes 2012 | Muertes 2013 | Muertes 2014 | Muertes 2015 | Muertes 2016 | Muertes 2017 | Total Muertes |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALICO AMIENTO V | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIDENTALEC | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - ENVENENAMIENTO | De 0 a antes de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A | De 01 a 04 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSTANCIAS NOCIVAS | Menores 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que en peor situación se encuentran para esto se elaborará una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularán los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

El municipio usará como valor de referencia al departamento. Se describirán y analizarán los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en un periodo de 2005 a 2016. Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que: Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el municipio presenta peor situación que el departamento del Valle y los valores menores de uno indican una mejor situación.

Para evitar la clasificación erróneamente del municipio, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el del Valle del Cauca

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio y el del Valle del Cauca.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio y el del Valle del Cauca

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2016.

- ∑Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
- ✓Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- -Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Tabla 61. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Razón de mortalidad materna | 467,29 | 446,43 | 0,00 | 0,00 | 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 9,35 | 13,39 | 11,90 | 17,54 | 6,80 | 14,39 | 15,50 | 32,00 | 6,94 | 20,83 | 28,30 | 7,87 |
| Tasa de mortalidad infantil | 32,71 | 22,32 | 23,81 | 26,32 | 13,61 | 28,78 | 23,26 | 48,00 | 13,89 | 20,83 | 37,74 | 15,75 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 42,06 | 31,25 | 29,76 | 43,86 | 27,21 | 35,97 | 38,76 | 48,00 | 20,83 | 20,83 | 56,60 | 23,62 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 98,43 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 222,97 | 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,31 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 98,43 | 102,56 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,31 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 216,92 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

En el año 2016 no hubo incidencia de: mortalidad materna, mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, su mayor incidencia se dio en la mortalidad por EDA en menores de 5 años y en la mortalidad por IRA en menores de 5 años.

Tasa de mortalidad neonatal: la tasa de mortalidad neonatal es de (7,87) en el Municipio, está por encima de los puntos porcentuales del Departamento (6,74) para el año 2016.

Tasa de mortalidad infantil ajustada: en el 2016 la tasa de mortalidad infantil en El Dovio es de (15,75) siendo esta mayor en el municipio en comparación con el Valle Del Cauca que cuenta con (9,85).

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE): en el 2016 la tasa de mortalidad en la niñez para El Dovio es de (23,62) muy por encima de los puntos porcentuales en comparación con el Valle del Cauca (11,37).

Las tasas de mortalidad por IRA Y EDA en menores de 5 años, es un tema de mucho cuidado y que las tasas tienen un porcentaje muy elevado comparando con el Departamento para el año 2016.

Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio El Dovio, 2005- 2016.

| | VALLE | | | | | Co | mp | orta | mie | nto | | | |
|--|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Causa de muerte | DEL | DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Razón de mortalidad materna | 47,29 | 0,00 | 7 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de mortalidad neonatal | 6,74 | 7,87 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Tasa de mortalidad infantil | 9,85 | 15,75 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 11,37 | 23,62 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 7 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 11,79 | 125,31 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 2,47 | 125,31 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 3,56 | 0,00 | 7 | _ | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | _ | _ | - |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

A continuación, se profundizará en los 3 indicadores que marcaron rojo en el semáforo y las demás mortalidades en comparación con el Departamento del Valle del Cauca.

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años

La tasa de mortalidad por IRA en El Dovio es más alta que en el Valle del Cauca para cinco de los doce años de estudio. Alcanzando los máximos valores para los años 2009 (222,97), en comparación con el Departamento para el año 2016 observamos una incidencia muy alto, tema para priorizar con las diferentes Instituciones se encuentran presentes en los temas de Salud.




Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016.

Tabla 63. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| EL DOVIO | 98,43 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 222,97 | 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,31 |
| VALLE DEL CAUCA | 18,51 | 20,59 | 18,22 | 13,02 | 16,09 | 10,26 | 13,28 | 14,91 | 11,03 | 8,81 | 9,62 | 11,79 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años.

La tasa de mortalidad por EDA en El Dovio es más alta que en el Valle del Cauca para cinco de los doce años de estudio. Alcanzando los máximos valores para los años 2016 (125,31), siendo un tema de mucho cuida ya que supera enormemente los porcentajes presentados por el Departamento, se debe trabajar en conjunto con los demás entes y articular procesos que ayuden a mitigar el impacto.




Figura 38. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016.

Tabla 64. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en El Dovio, 2005- 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| EL DOVIO | 98,43 | 102,56 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,31 |
| VALLE DEL CAUCA | 10,62 | 8,24 | 9,94 | 4,71 | 3,61 | 4,44 | 3,04 | 3,04 | 2,21 | 1,38 | 1,92 | 2,47 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad en la Niñez.

La tasa de mortalidad en la niñez es más alta para el municipio de El Dovio en comparación con el Valle del Cauca, esto para los doce años de estudio. Se observa que para el año 2012 presenta una tendencia creciente y para el año 2015 se observa un aumento en la tasa y decreciente para el año 2016.




Figura 39. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio El Dovio, 2005 - 2016.

Tabla 65. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EL DOVIO | 42,06 | 31,25 | 29,76 | 43,86 | 27,21 | 35,97 | 38,76 | 48,00 | 20,83 | 20,83 | 56,60 | 23,62 |
| VALLE DEL CAUCA | 16,02 | 16,33 | 14,73 | 15,72 | 13,81 | 13,84 | 13,07 | 12,99 | 12,01 | 11,08 | 11,94 | 11,37 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa mortalidad materna.

La razón de mortalidad materna a nivel Municipal presenta un pico en el año 2009, año del periodo en el que se encuentra por encima del nivel Departamental (también 2005 y 2006). En el año 2016 fue de (0,00) ubicándose por debajo del indicador Departamental que fue (4,29).




Figura 40. Tasa de mortalidad materna, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 66. Tasa de mortalidad materna, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| EL DOVIO | 467,29 | 446,43 | 0,00 | 0,00 | 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALLE DEL CAUCA | 88,29 | 66,76 | 64,48 | 44,72 | 56,53 | 54,98 | 57,04 | 75,13 | 45,70 | 37,43 | 63,73 | 4,29 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad neonatal

Para todos los años de estudio la Tasa de Mortalidad Neonatal presenta un comportamiento por encima de la referencia Departamental en su mayoría, se observa que solo para el año 2009 se encuentra por debajo de la cifra en referencia (6,80), con relación a la Departamental (7,11).




Figura 41. Tasa de mortalidad neonatal, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 67. Tasa de mortalidad neonatal, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| EL DOVIO | | 9,35 | 13,39 | 11,90 | 17,54 | 6,80 | 14,39 | 15,50 | 32,00 | 6,94 | 20,83 | 28,30 | 7,87 |
| VALLE | DEL | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | | 8,17 | 8,32 | 8,22 | 8,68 | 7,11 | 7,09 | 7,11 | 7,35 | 6,53 | 6,27 | 6,74 | 6,74 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad infantil

La Tasa de Mortalidad infantil presenta en el municipio de El Dovio un comportamiento variable en referencia al Departamento y con tendencia a la disminución en los años 2009, 2013 y 2016, alcanzando el punto más bajo en el año 2009 (13,61), observándose una reducción con respecto al año 2008 y al año 2010, para el año 2016 se observa una reducción.




Figura 42. Tasa de mortalidad infantil, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 68. Tasa de mortalidad infantil, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EL DOVIO | 32,71 | 22,32 | 23,81 | 26,32 | 13,61 | 28,78 | 23,26 | 48,00 | 13,89 | 20,83 | 37,74 | 15,75 |
| VALLE DEL CAUCA | 12,84 | 13,35 | 12,17 | 13,32 | 11,42 | 11,36 | 10,68 | 10,73 | 9,65 | 9,45 | 10,24 | 9,85 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad por desnutrición

Las tasas específicas por Desnutrición han sido fluctuantes en el tiempo, alcanzando la tasa más alta en el año 2008 (216,92%). Se presenta una reducción con relación al año 2013 entre los años 2014 y 2016, mientras en el Departamento presenta un leve aumento.



Figura 43. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

Tabla 69. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio El Dovio, 2005 – 2016.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| EL DOVIO | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 216,92 | 0,00 | 114,81 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALLE DEL CAUCA | 9,53 | 4,39 | 3,59 | 4,99 | 6,10 | 3,33 | 1,94 | 4,14 | 6,89 | 4,40 | 6,04 | 3,56 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Determinantes Estructurales

Mortalidad materna según etnia

Solo hubo incidencia de mortalidad materna en el año 2009, esta alcanzo una razón de 1.098,9 por 100.000 nacidos vivos. La incidencia se presentó en otras etnias

Tabla 70. Razón de mortalidad materna por Etnia, municipio El Dovio

| Etnia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 – INDÍGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - ROM (GITANO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 1.098,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO REPORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 680,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Figura 44. Razón de mortalidad materna por Etnia, municipio El Dovio.

Mortalidad materna según Área

La incidencia tuvo lugar en el área rural dispersa, alcanzando una razón de 1.396,86 por 100.000 nacidos vivos.

Tabla 71. Razón de mortalidad materna por área, municipio El Dovio

| Área Geográfica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 – CABECERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 1.369,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIN INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 680,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tasa de mortalidad materna por Área 1400 2010 2011 1200 2012 2013 1000 2014 2015 2016 800 600 400 200 0 SIN INFORMACION 2 - CENTRO POBLADO 1 - CABECERA 3 - AREA RURAL DISPERSA

Figura 45. Razón de mortalidad materna por área, municipio El Dovio

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Tabla 72. Tasa de mortalidad neonatal por Departamento, Municipio y Etnia.

| Etnia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1 – INDÍGENA | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 64,52 | 86,96 | 0 |
| 2 - ROM (GITANO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 0 | 0 | 19,61 | 27,78 | 9,43 | 9,01 | 12,20 | 10,64 |
| NO REPORTADO | 41,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 6,80 | 14,39 | 15,50 | 32,00 | 6,94 | 20,83 | 28,30 | 7,87 |

Tasa de mortalidad neonatal por Etnia

NO REPORTADO

6 - OTRAS ETNIAS

19,61,27,78

2009
2010
2011
2012
2014
2014
2016
2 - ROM (GITANO)

1 - INDÍGENA

9 20 49 60 80 100

Figura 46. Tasa de mortalidad neonatal por Departamento, Municipio y Etnia.

En el periodo 2011 – 2013 no se presentaron casos de mortalidad neonatal en las minorías étnicas del municipio de El Dovio. Solo en los años 2009, 2010, 2014 y 2015 se observó una alta incidencia en la etnia indígena.

Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio El Dovio

Se observa que la mortalidad neonatal para el municipio de El Dovio presenta una mayor incidencia en el área rural dispersa, la incidencia estas por encima de los centros poblados y la cabecera.

Tabla 73. Tasa de mortalidad neonatal por Área, municipio El Dovio.

| Área Geográfica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1 – CABECERA | 0 | 0 | 15,63 | 0 | 0 | 0 | 17,54 | 18,87 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 13,70 | 32,79 | 16,39 | 52,63 | 11,24 | 44,78 | 45,45 | 0 |
| SIN INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 6,80 | 14,39 | 15,50 | 32,00 | 6,94 | 20,83 | 28,30 | 7,87 |

Tasa de mortalidad neonatal por Área 300 2009 2010 2011 250 2012 2013 2014 200 2015 2016 150 100 50 0a 2 - CENTRO POBLADO m SIN INFORMACION 3 - AREA RURAL DISPERSA 1 - CABECERA

Figura 47. Razón de mortalidad neonatal por área, municipio El Dovio.

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general

Grandes causas, mortalidad específica por subgrupo de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 74. Identificación de prioridades en salud del Municipio El Dovio 2016.

| Mortalidad | Prioridad | Municipio de El Dovio año 2016 | Departamento del Valle del Cauca año 2016 | Tendencia 2005 a 2016 | Grupos de Riesgo (MIAS) |
|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| General por | Enfermedades del sistema circulatorio por 100.000 hab. | 306,59 | 160,9 | Aumenta | 001 |
| grandes causas* | 2. Neoplasias por 100.000 hab. | 200,56 | 94,5 | Aumenta | 007 |
| | 3. Todas las demas enfermedades. | 168,11 | 123,7 | Aumenta | 000 |
| | Causas Externas: Accidentes de transporte terrestre | 34,7 | 19,43 | Fluctua | 012 |
| | 2. Enfermedades del sistema circulatorio: Cerebrovasculares (Hombres) | 71,87 | 43,85 | Aumento | 001 |
| Específica por Subcausas o | 3. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias agudas | 35,12 | 20,42 | Fluctua | 009 |
| subgrupos | 4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón | 205,43 | 89,57 | Aumenta | 001 |
| | 5.Neoplasias: Tumor maligno de la próstata | 48,34 | 17,45 | Fluctua | 007 |
| | 6. Todas las demas:Resto de enfermedades del sistema digestivo | 24,02 | 14,01 | Fluctua | 000 |
| Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas | Tasa Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 22,97 | 6,57 | Aumento | 009 |
| Mortalidad Materno infantil y en la | 1. Tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de 5 años | 125,31 | 11,79 | Aumenta | 009 |
| niñez: Indicadores | 2. Tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de 5 años | 125,31 | 2,47 | Aumenta | 009 |

Fuente: Registro individual de defunción. DANE-SISPRO

Conclusiones

Durante el periodo 2005 al 2016, las tasas ajustadas por la edad en El Dovio han tenido una tendencia variable, observándose un aumento de la tasa para las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias, causas externas en los dos últimos años del periodo. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia al aumento durante 2005 al 2016 de la tasa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio y un aumento también de las causas externas en los años 2010 y 2014, mientras tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia aumento en este mismo periodo para las neoplasias y las muertes debidas al sistema circulatorio. Creemos entonces que los problemas de mayor incidencia está en los hombres por presión arterial, aunque en las mujeres tiende a aumentar debido a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol entre otras causas, sin olvidar el estrés por situación económica, problemas intrafamiliares, embarazos en adolescentes, el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera.

Durante el periodo entre 2005 a 2016, en la población general, las causas externas son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio; En los hombres las causas

externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió al grupo denominado demás causas.

Para las diferentes subcausas se puede observar que, tanto para los hombres como para las mujeres en el grupo de las enfermedades transmisibles, son las infecciones respiratorias agudas las de mayor incidencia.

En las neoplasias en mujeres se destacan la incidencia de las muertes por cáncer de cuello del útero y las causadas por cáncer de mama. Con relación al subgrupo de muertes debidas a problemas del sistema circulatorio se destaca de manera preponderante, tanto en hombres como en mujeres, las enfermedades isquémicas del corazón.

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2016, la principal causa de defunciones fueron Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, seguida por los problemas respiratorios y las malformaciones congénitas. En los hombres priman las enfermedades respiratorias y las malformaciones congénitas. En las mujeres son más relevantes ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

El análisis de los diferentes subgrupos de enfermedades permite observar que para las infecciosas y parasitarias es la diarrea y gastroenteritis; para las neoplasias fueron el Resto de tumores malignos la única causa que presentó casos. Para las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas todas las muertes fueron por desnutrición; en las enfermedades del sistema respiratorio es la neumonía la de mayor incidencia.

En las causas de mortalidad encontramos en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que son los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal la de mayor incidencia especialmente en el género masculino que presenta 2 casos en el año 2013 y 2 casos en el año 2014 en su mayor proporción, en el subgrupo de malformaciones son las malformaciones congénitas del corazón y en las causas externas el caso que se presentó fue por ahogamiento accidental.

Es posible que en el municipio de El Dovio su propia situación geográfica esté determinando algunas de las situaciones de mortalidad analizadas; las distancias entre las veredas más lejanas y los centros urbanos en donde se atienden las diferentes condiciones de salud, pueden interferir para que las personas acudan de manera oportuna para las atenciones en salud. Las dinámicas de violencia propias de esa región, debido a la presencia de los grupos armados relacionados con el narcotráfico que se han disputado zonas estratégicas como es el cañón de las garrapatas, muy seguramente determinan los altos índices de homicidio que han ocurrido en el municipio.

Una mortalidad específica que se resalta de manera especial es el tumor maligno de la próstata pues el indicador es seleccionado dentro de los indicadores de monitoreo del Plan Decenal de Salud Pública y supera con significancia estadística el valor departamental para el año 2016. Otro indicador seleccionado es el de mortalidad por accidentes de transporte terrestre, pero estos tienen una incidencia mucho más elevada en los hombres, para el tema de la incidencia en las mujeres es la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino

que supera el porcentaje presentado por el departamento de Valle del Cauca en el 2016, teniendo presente que los casos de trastornos mentales y del comportamiento es una tasa que está muy por encima de lo registrado por el Departamento.

2.2 Análisis de la Morbilidad

Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. Se utilizarán medidas de frecuencia con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

2.2.1 Principales causas de Morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Al analizar la morbilidad atendida según grandes causas en el Municipio de El Dovio durante el periodo 2009 - 2017 para la población general, se observa que en ninguno de los ciclos vitales ni en las causas se ha presentado una variación que signifique una alarma, ya que los cambios han sido variables sin mucha tendencia a la baja o al alta, se puede observar un incremento de las lesiones en los adolescentes comparando los años 2016 y 2017.

Tabla 75. Proporción de las principales causas de morbilidad en ambos sexos, municipio El Dovio 2009 – 2017.

| | | | | | | To | otal | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------|
| Giclo vital | Gran causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017-2016 |
| Primera infancia (0 - 5años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 45,89 | 50,09 | 64,81 | 65,13 | 58,65 | 51,38 | 46,58 | 40,73 | 31,69 | -9,04 |
| | Condiciones perinatales | 1,93 | 0,49 | 0,75 | 1,25 | 0,61 | 1,40 | 0,30 | 0,33 | 1,64 | 1,31 |
| | Enfermedades no transmisibles | 29,95 | 34,01 | 20,32 | 18,28 | 23,07 | 30,34 | 30,37 | 33,20 | 40,71 | 7 51 |
| | Lesiones | 6,76 | 5,66 | 4,06 | 4,29 | 4,25 | 6,22 | 5,33 | 4,78 | 5,19 | 0,41 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,46 | 9,75 | 10,05 | 11,04 | 13,42 | 10,66 | 17,43 | 20,96 | 20,77 | -0,19 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 35,37 | 45,57 | 34,30 | 35,74 | 36,07 | 37,21 | 30,66 | 29,95 | 21,87 | -8,09 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,00 | 0,41 | 0,53 | 0,13 |
| | Enfermedades no transmisibles | 40,24 | 37,24 | 53,23 | 50,80 | 46,21 | 38 ,93 | 47, 07 | 44,02 | 42,40 | -1,62 |
| | Lesiones | 12,20 | 6,83 | 2,90 | 4,14 | 3,64 | 8,32 | 5,98 | 5,21 | 15,73 | 1 <mark>0.5</mark> 3 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,20 | 10,21 | 9,57 | 9,27 | 14,00 | 15,27 | 16,28 | 20,42 | 19,47 | -0,95 |
| Adolescencia | | | | | | | | | | | - |
| (12 -18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 20,00 | 23,38 | 19,84 | 16,09 | 19,01 | 19,85 | 14,68 | 15,60 | 7,50 | -8,10 |
| | Condiciones maternas | 1,25 | 2,00 | 1,33 | 2,62 | 3,27 | 3,21 | 3,13 | 2,13 | 4,77 | 2 65 |
| | Enfermedades no transmisibles | 51,25 | 52,41 | 65,08 | 64,23 | 50,34 | 51,89 | 50,85 | 53,38 | 50,23 | -3,16 |
| | Lesiones | 18,75 | 8,15 | 4,32 | 4,61 | 5,38 | 8,43 | 12,62 | 7,99 | 23,86 | 15,87 |
| | Condiciones mal clasificadas | 8,75 | 14,06 | 9,42 | 12,45 | 22,00 | 16,62 | 18,71 | 20,89 | 13,64 | -7,25 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 13,90 | 21,10 | 15,39 | 13,43 | 13,15 | 16,13 | 12,81 | 12,50 | 7,62 | 4,87 |
| | Condiciones maternas | 5,83 | 2,64 | 2,46 | 5,56 | 5,07 | 6,50 | 4,68 | 5,07 | 12,08 | 700 |
| | Enfermedades no transmisibles | 47,09 | 53,83 | 65,51 | 61,84 | 49,35 | 53,66 | 52,77 | 54,52 | 49,80 | 4,72 |
| | Lesiones | 15,25 | 6,36 | 5,93 | 4,69 | 6,09 | 6,74 | 10,04 | 6,44 | 15,15 | 8,71 |
| | Condiciones mal clasificadas | 17,94 | 16,07 | 10,72 | 14,49 | 26,34 | 16,98 | 19,70 | 21,47 | 15,35 | -6,13 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 14,48 | 13,23 | 10,99 | 8,90 | 10,09 | 9,81 | 9,67 | 6,88 | 6,42 | -0,46 |
| | Condiciones maternas | 3,16 | 0,51 | 1,07 | 1,81 | 0,99 | 1,05 | 0,69 | 1,33 | 4,32 | 299 |
| | Enfermedades no transmisibles | 62,77 | 71,77 | 74,42 | 72,27 | 67,41 | 74,70 | 72,50 | 72,54 | 70,89 | -1,65 |
| | Lesiones | 6,81 | 4,47 | 4,35 | 5,69 | 4,45 | 4,63 | 4,34 | 4,42 | 7,20 | 2 79 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,77 | 10,02 | 9,16 | 11,33 | 17,06 | 9,81 | 12,81 | 14,83 | 11,17 | \$,66 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 11,16 | 7,61 | 7,64 | 5,33 | 5,14 | 6,21 | 5,99 | 4,71 | 3,36 | -1,35 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · | Enfermedades no transmisibles | 72,53 | 83,79 | 80,45 | 85,00 | 85,50 | 83,89 | 82,66 | 81,62 | 80,58 | -1,03 |
| | Lesiones | 5,58 | 2,88 | 3,82 | 2,89 | 2,59 | 3,74 | 3,15 | 3,94 | 7,05 | 3 10 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,73 | 5,72 | 8,08 | 6,78 | 6,76 | 6,11 | 8,20 | 9,73 | 9,01 | -0,72 |
| | | | | | | | | | | L | |

Principales causas de morbilidad en hombres

Al analizar la morbilidad atendida según grandes causas en el Municipio de El Dovio durante el periodo 2009 - 2017 para la población masculina, se observa que en ninguno de los ciclos vitales ni en las causas se ha presentado una variación que signifique una alarma, ya que los cambios han sido variables sin mucha tendencia a la baja o al alta, las lesiones en la adolescencia es la de mayor impacto.

Tabla 76. Proporción de las principales causas de morbilidad en hombres, municipio El Dovio 2009 – 2017.

| | _ | Hombres | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017-2016 |
| Primera infancia | Condiciones transmisibles y | 45,32 | 48,34 | 67,41 | 68,09 | 63,93 | 51,93 | 48,54 | 42,51 | 31,98 | -10,53 |
| (0 - 5años) | nutricionales | 4 44 | 0.75 | 0.00 | 4.05 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | d 40 |
| | Condiciones perinatales | 1,44 | 0,75 | 0,93 | 1,35 | 0,11 | 0,32 | 0,29 | 0,49 | 2,91 | 2,42 |
| | Enfermedades no transmisibles | 29,50 | 34,77 | 17,32 | 15,84 | 20,72 | 2 9,96 | 3 1,63 | 30,84 | 37 ,21 | 6,37 |
| | Lesiones | 7,91 | 5,71 | 4,28 | 4,11 | 3,62 | 7,13 | 5,98 | 6,51 | 7,56 | 1,05 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,83 | 10,43 | 10,06 | 10,61 | 11,62 | 10,66 | 13,56 | 19,66 | 20,35 | 0,69 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 44,00 | 45,81 | 36,38 | 36,72 | 35,41 | 33,58 | 30,68 | 28,11 | 2 1,33 | -6,79 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,47 | 0,22 |
| | Enfermedades no transmisibles | 30,00 | 40,10 | 53,43 | 51,22 | 45,00 | 40,38 | 46,03 | 46 ,60 | 41,23 | - 5,37 |
| | Lesiones | 20,00 | 5,54 | 3,33 | 4,33 | 4,05 | 9,06 | 8,22 | 6,55 | 14,22 | 7 <mark>,6</mark> 7 |
| | Condiciones mal clasificadas | 6,00 | 8,22 | 6,86 | 7,64 | 15,54 | 16,98 | 15,07 | 18,49 | 2 2,75 | 4 26 |
| | | | | | | | | | | | |
| Adolescencia | Condiciones transmisibles y | 14,00 | 25,77 | 21,43 | 16,88 | 23,48 | 24,27 | 15,42 | 20,19 | 5,29 | -14,90 |
| (12 -18 años) | nutricionales | 14,00 | 20,11 | 21,40 | 10,00 | 25,40 | 27,21 | 10,72 | 20,13 | 5,25 | - 14,50 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 54,00 | 48,68 | 62,90 | 67,01 | 52,72 | 44,96 | 43,96 | 45 ,96 | 43,75 | -2,21 |
| | Lesiones | 22,00 | 12,11 | 5,07 | 5,60 | 8,47 | 15,38 | 2 5,63 | 14,91 | 41,35 | 26,44 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,00 | 12,56 | 10,60 | 10,43 | 15,02 | 15,38 | 14,79 | 18,94 | 9,62 | -9,33 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 14,00 | 23,02 | 17,40 | 14,47 | 18,82 | 18,69 | 14,00 | 15,54 | 7,57 | -7,97 |
| (*** 20 000) | Condiciones maternas | 0,00 | 0,42 | 0.00 | 0.06 | 0,22 | 0,00 | 0,12 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 48,00 | 51,43 | 64,76 | 65,85 | 55,23 | 50,96 | 45,58 | 49,00 | 49,73 | 0,73 |
| | Lesiones | 23,00 | 11,19 | 7,56 | 6,95 | 12,14 | 13,12 | 22,73 | 13,63 | 30,81 | 17,18 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,00 | 13,94 | 10,27 | 12,67 | 13,59 | 17,23 | 17,57 | 21,83 | 11,89 | -9,94 |
| | | | | | | | | | | | į, |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 16,01 | 14,09 | 12,41 | 9,18 | 12,75 | 10,29 | 11,51 | 7,41 | 7,70 | 0,29 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 63,70 | 68,13 | 72,24 | 69,07 | 64,81 | 71,08 | 66,01 | 70,14 | 67,84 | -2 ,30 |
| | Lesiones | 9,25 | 7,27 | 7,40 | 11,60 | 8,26 | 8,31 | 8,13 | 7,99 | 11,44 | 3 45 |
| _ | Condiciones mal clasificadas | 11,03 | 10,51 | 7,96 | 10,10 | 14,18 | 10,29 | 14,35 | 14,46 | 13,02 | -1,43 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 16,91 | 7,40 | 8,79 | 6,65 | 5,42 | 6,22 | 5,60 | 4,60 | 2,72 | -1,88 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 69,12 | 81,74 | 78,02 | 81,82 | 83,70 | 83,12 | 81,25 | 80,79 | 79,04 | -1,75 |
| | Lesiones | 6,62 | 3,74 | 4,64 | 3,02 | 2,58 | 3,83 | 3,65 | 3,41 | 6,62 | 3 22 |
| | Condiciones mal clasificadas | 7,35 | 7,12 | 8,55 | 8,50 | 8,30 | 6,83 | 9,51 | 11,21 | 11,62 | 0,41 |
| | | | | | | | | | | | |

Principales causas de Morbilidad en Mujeres

Primera infancia: las condiciones transmisibles y nutricionales aportan gran parte de las consultas de este grupo de edad, observando un leve aumento que pasa del año 2016 con (45,89), reflejando un incremento de (4,20) comparado con el año 2017.

Infancia: Las lesiones aportan gran parte de las consultas de este grupo de edad; se observa el aumento el año 2017 pasando de 3,71 en el 2016 a 17,68 en 2017.

Adolescencia: Las condiciones maternas aportan gran parte de las consultas de este grupo de edad; se observa el aumento para el año 2017.

Juventud: Las Lesiones manejan un gran porcentaje, pasando del año 2106 (7,60) al año 2017 con (19,06) Adultez: Las Condiciones maternas son las de mayor relevancia, comparando los años 2016 y 2017 respectivamente.

Persona mayor: Para las mujeres mayores se presenta un leve incremento comparando los dos ulmos años 2106 y 2017.

Tabla 77. Proporción de las principales causas de morbilidad en mujeres Municipio El Dovio, 2009 – 2017.

| | T | | | | | Mui | eres | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--|
| Ciclo vital | Gran causa de morbildad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017-2016 |
| Primera infancia (0 - 5años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 47,06 | 51,54 | 61,31 | 60,73 | 52,11 | 50,56 | 50,56 | 45,89 | 50,09 | 4,20 |
| | Condiciones perinatales | 2,94 | 0,27 | 0,50 | 1,11 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,93 | 0,49 | -1,44 |
| | Enfermedades no transmisibles | 30,88 | 33,38 | 24,37 | 21,91 | 25,99 | 30,06 | 30,06 | 29,95 | 34,01 | 406 |
| | Lesiones | 4,41 | 5,62 | 3,77 | 4,56 | 5,03 | 4,71 | 4,71 | 6,76 | 5,66 | -1,10 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,71 | 9,18 | 10,05 | 11,68 | 15,65 | 13,46 | 13,46 | 15,46 | 9,75 | -5,71 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 21,88 | 45,38 | 32,07 | 34,46 | 36,82 | 40,24 | 30,64 | 32,00 | 22,56 | -9,44 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,51 | 0,00 | 0,57 | 0,61 | 0,04 |
| | Enfermedades no transmisibles | 56,25 | 34,92 | 53,01 | 50,26 | 47,58 | 37,71 | 47,98 | 41,14 | 43,90 | 2,76 |
| | Lesiones | 0,00 | 7,88 | 2,45 | 3,90 | 3,18 | 7,71 | 4,04 | 3,71 | 17,68 | 13,97 |
| | Condiciones mal clasificadas | 21,88 | 11,82 | 12,47 | 11,38 | 12,27 | 13,83 | 17,34 | 2 2,57 | 15,24 | -7,33 |
| Adelesees | + | | | | | | | | | | |
| Adolescencia (12 -18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 30,00 | 21,93 | 18,38 | 15,30 | 15,68 | 17,09 | 14,13 | 12,35 | 9,48 | -2,87 |
| | Condiciones maternas | 3,33 | 2,67 | 2,56 | 5,16 | 5,46 | 5,22 | 5,34 | 3,64 | 9,05 | 5 <mark>,</mark> 41 |
| | Enfermedades no transmisibles | 46,67 | 54,68 | 67,09 | 61,45 | 48,57 | 56,23 | 56,04 | 58,65 | 56,03 | -2,62 |
| | Lesiones | 13,33 | 5,75 | 3,63 | 3,63 | 3,09 | 4,07 | 2,83 | 3,09 | 8,19 | 5,10 |
| | Condiciones mal clasificadas | 6,67 | 14,97 | 8,33 | 14,45 | 2 7,20 | 17,39 | 21,66 | 22,27 | 17,24 | -5,03 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 13,82 | 20,30 | 13,93 | 12,70 | 10,56 | 14,93 | 12,17 | 10,98 | 7,66 | -3,32 |
| | Condiciones maternas | 10,57 | 3,56 | 4,23 | 9,41 | 7,29 | 9,54 | 7,15 | 7,60 | 19,06 | 1 <mark>1,4</mark> 6 |
| | Enfermedades no transmisibles | 46,34 | 54,83 | 66,05 | 59,03 | 46 ,66 | 54,92 | 56,68 | 57,27 | 49,84 | -7,43 |
| | Lesiones | 8,94 | 4,35 | 4,75 | 3,11 | 3,31 | 3,75 | 3,14 | 2,85 | 6,09 | 3 24 |
| | Condiciones mal clasificadas | 20,33 | 16,96 | 11,04 | 15,76 | 32,18 | 16,86 | 20,86 | 21,29 | 17,34 | -3,95 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 13,68 | 12,90 | 10,21 | 8,75 | 8,78 | 9,61 | 8,80 | 6,68 | 5,90 | -0,78 |
| | Condiciones maternas | 4,81 | 0,71 | 1,67 | 2,76 | 1,48 | 1,48 | 1,02 | 1,83 | 6,08 | 425 |
| | Enfermedades no transmisibles | 62,29 | 73,15 | 75,62 | 73,99 | 68,68 | 76,21 | 75,52 | 73,46 | 72,13 | -1,33 |
| | Lesiones | 5,55 | 3,41 | 2,67 | 2,51 | 2,59 | 3,08 | 2,57 | 3,06 | 5,48 | 2,42 |
| | Condiciones mal clasificadas | 13,68 | 9,84 | 9,82 | 12,00 | 18,47 | 9,61 | 12,09 | 14,97 | 10,41 | -4,56 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 3,09 | 7,75 | 6,44 | 4,20 | 4,91 | 6,19 | 6,27 | 4,78 | 3,88 | -0,90 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 77,32 | 85,24 | 83,01 | 87,71 | 87,03 | 84,46 | 83,69 | 82,18 | 81,85 | -0,33 |
| | Lesiones | 4,12 | 2,28 | 2,96 | 2,78 | 2,60 | 3,68 | 2,79 | 4,31 | 7,39 | 3 08 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,46 | 4,73 | 7,59 | 5,30 | 5,46 | 5,58 | 7,24 | 8,72 | 6,87 | -1,85 |
| | 1 | | | | | | | | | | |

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS,

Hombres

En el Municipio de El Dovio Valle del Cauca durante el periodo 2009 a 2017, la primera causa de morbilidad fueron las Lesiones Intencionales comparando el año 2016 (0,16) y 2017 (11,27), con un incremento del 11,11 respectivamente.

Otra causa de morbilidad de los hombres para tener presente son las Infecciones Respiratorias a la hora de hacer un análisis de los dos últimos años 2016 y 2017, donde refleja un aumento de (7,25)

Tabla 78. Morbilidad por subgrupos en hombres Municipio El Dovio, 2009 – 2017.

| | | | | | | Но | mbres | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017-2016 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10- | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) | 68,39 | 62,92 | 72,24 | 67,40 | 51,27 | 55,99 | 48,32 | 48,68 | 40,93 | -7,75 |
| J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 29,31 | 36,80 | 27,04 | 29,69 | 48,09 | 42,85 | 50,42 | 50,55 | 57,81 | 7,25 |
| | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50- D53, D64.9, E51-E64)) | 2,30 | 0,28 | 0,71 | 2,91 | 0,64 | 1,16 | 1,26 | 0,77 | 1,27 | 0,50 |
| Condiciones maternas perinatales (000-099, | Condiciones maternas (O00-O99) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P00-P96) | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00- P96) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,45 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, | Neoplasias malignas (C00-C97) | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 0.39 | 0.66 | 2.29 | 1.05 | 1.20 | 1.32 | 0.12 |
| D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, | Otras neoplasias (D00-D48) | 0,30 | 0,09 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,42 | 0,54 | 0,65 | 0,47 | -0,18 |
| E03-E07, E10-E16, E20-E34, | Diabetes mellitus (E10-E14) | 4.21 | 2.04 | 1,22 | 0,21 | 1.53 | 1.82 | 1,43 | 0.98 | 1.42 | 0.44 |
| E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68- H93, 100-199, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75- N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65- D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 3,22 | 2,81 | 1,41 | 1,94 | 4,11 | 4,41 | 4,66 | 3,87 | 3,06 | -0,81 |
| | Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) | 1,98 | 7,01 | 3,32 | 4,74 | 5,03 | 7,18 | 8,83 | 8,91 | 12,29 | 3,38 |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) | 5,45 | 6,74 | 4,42 | 4,68 | 5,42 | 4,93 | 4,90 | 6,15 | 7,75 | 1,61 |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 16,58 | 30,57 | 16,69 | 18,17 | 28,62 | 32,29 | 31,12 | 31,64 | 29,38 | -2,26 |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 4,21 | 5,37 | 4,08 | 3,71 | 4,04 | 5,04 | 5,55 | 4,40 | 6,22 | 1,82 |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 6,93 | 5,84 | 5,14 | 5,09 | 6,05 | 5,36 | 5,14 | 5,87 | 5,70 | -0,18 |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 6,44 | 4,50 | 4,65 | 4,44 | 6,20 | 7,71 | 8,02 | 7,40 | 9,18 | 1,78 |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 6,44 | 5,44 | 5,87 | 6,18 | 6,29 | 4,72 | 5,95 | 5,07 | 4,59 | -0,49 |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) | 15,35 | 12,68 | 12,96 | 10,07 | 11,82 | 10,77 | 10,93 | 10,58 | 10,39 | -0,19 |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 1,24 | 1,40 | 0,11 | 0,80 | 0,96 | 0,80 | 0,54 | 0,73 | 1,48 | 0,75 |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 27,23 | 14,88 | 39,56 | 38,75 | 18,96 | 12,27 | 11,36 | 12,53 | 6,75 | -5,78 |
| | | | | | | | | | | | |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 8,89 | 5,46 | 2,04 | 4,75 | 7,17 | 8,83 | 7,37 | 7,38 | 3,84 | -3,54 |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,84 | 0,33 | 0,00 | 0,16 | 11,27 | 11,11 |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,42 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) | 91,11 | 94,54 | 97,55 | 95,09 | 91,56 | 90,58 | 92,63 | 92,46 | 84,89 | -7,57 |
| Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 355,53 | 323,13 | 122,23 | | 100,00 | 321,23 | 222,23 | , | |

Mujeres

En el género femenino son las enfermedades genitourinarias las de mayor incidencia comparando los años 2016 (11,77) y 2017 (14,60) respectivamente, otra incidencia a tener presente con los mismos años de comparación son las enfermedades de los órganos de los sentidos.

Tabla 79. Morbilidad por subgrupos en mujeres Municipio El Dovio, 2009 – 2017.

| | | | | | | Mı | ujeres | | Mujeres bilidad | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017- 2016 | | | | | | | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70- | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00- B99, G00, G03-G04,N70-N73) | 69,72 | 60,38 | 71,97 | 63,58 | 51,59 | 51,33 | 46,38 | 47,05 | 45,56 | -1,49 | | | | | | | | | |
| N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51- | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 28,17 | 39,11 | 27,58 | 33,99 | 46,75 | 46,88 | 52,19 | 52,27 | 51,29 | -0,98 | | | | | | | | | |
| E64) | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)) | 2,11 | 0,51 | 0,45 | 2,42 | 1,66 | 1,79 | 1,43 | 0,68 | 3,15 | 2,47 | | | | | | | | | |
| Condiciones maternas perinatales (O00- | Condiciones maternas (O00-O99) | 90,48 | 87,82 | 94,62 | 96,77 | 95,94 | 94.81 | 98.36 | 98,10 | 99.28 | 1,18 | | | | | | | | | |
| O99, P00-P96) | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) | 9,52 | 12,18 | 5,38 | 3,23 | 4,06 | 5,19 | 1,64 | 1,90 | 0,72 | -1,18 | | | | | | | | | |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, | Neoplasias malignas (C00-C97) | 3,07 | 0,18 | 0,36 | 0,78 | 0,47 | 0,73 | 1,04 | 1,31 | 1,65 | 0,34 | | | | | | | | | |
| D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, | Otras neoplasias (D00-D48) | 4,21 | 0,38 | 0,71 | 0,78 | 0,61 | 0,93 | 1,16 | 1,11 | 2,36 | 1,25 | | | | | | | | | |
| E03-E07, E10-E16, E20-E34, | Diabetes mellitus (E10-E14) | 1,53 | 2,21 | 1,86 | 1,57 | 1,88 | 2,41 | 2,55 | 1,80 | 3,40 | 1,60 | | | | | | | | | |
| E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68- H93, 100-199, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 4,60 | 4,23 | 3,09 | 3,20 | 5,81 | 6,52 | 7,76 | 6,87 | 5,54 | -1,34 | | | | | | | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) | 9,39 | 6,81 | 7,46 | 5,39 | 5,01 | 6,82 | 6,39 | 7,34 | 9,24 | 1,90 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) | 4,79 | 4,75 | 3,58 | 2,95 | 3,70 | 5,07 | 4,33 | 4,98 | 7,19 | 2,21 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 13,03 | 33,82 | 17,68 | 23,37 | 31,52 | 32,03 | 31,27 | 28,47 | 25,64 | -2,83 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 2,68 | 3,14 | 1,53 | 2,04 | 2,70 | 2,40 | 2,46 | 4,04 | 3,52 | -0,52 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 10,54 | 6,07 | 7,76 | 8,03 | 6,24 | 6,61 | 6,37 | 7,58 | 5,69 | -1,89 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 15,13 | 9,32 | 11,37 | 10,49 | 10,32 | 11,59 | 13,61 | 11,77 | 14,60 | 2,82 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 4,02 | 4,20 | 4,56 | 4,50 | 4,12 | 3,34 | 3,93 | 4,07 | 2,85 | -1,22 | | | | | | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas (M00- M99) | 12,64 | 12,78 | 12,71 | 12,15 | 12,00 | 10,46 | 9,44 | 9,24 | 10,71 | 1,47 | | | | | | | | | |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 0,38 | 1,15 | 0,11 | 0,45 | 1,52 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,92 | 0,41 | | | | | | | | | |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 13,98 | 10,96 | 27,22 | 24,29 | 14,11 | 10,60 | 9,20 | 10,90 | 6,70 | -4,20 | | | | | | | | | |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 9,62 | 4,36 | 5,78 | 4,78 | 10,09 | 12,17 | 6,69 | 4,87 | 5,47 | 0,59 | | | | | | | | | |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,56 | 0,59 | 0,24 | 1,41 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | | | | | | | | | |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,30 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00- T98) | 86,54 | 95,64 | 87,28 | 94,38 | 89,02 | 87,59 | 91,55 | 95,13 | 93,57 | -1,56 | | | | | | | | | |
| Signos y síntomas mal definidos (R00- R99) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Ambos Sexos

Para la población general del municipio de El Dovio Valle del Cauca son las Lesiones Intencionales las de mayor peso si observamos os años 2016 (0,09) y 2017 (6,87), seguidas de las condiciones neuropsiquiatricas con un aumento en los años 2016 y 2017.

Tabla 80. Morbilidad por subgrupos en Ambos Sexos Municipio El Dovio, 2009 - 2017

| | | | | | | Tot | al | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ pp 2017- 2016 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00- B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) | 68,99 | 61,34 | 72,12 | 65,64 | 51,43 | 53,33 | 47,24 | 47,77 | 43,69 | -4,08 |
| H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 28,80 | 38,24 | 27,30 | 31,67 | 47,44 | 45,15 | 51,40 | 51,51 | 53,92 | 2,41 |
| | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)) | 2,22 | 0,42 | 0,59 | 2,69 | 1,13 | 1,52 | 1,36 | 0,72 | 2,39 | 1,67 |
| Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00- | Condiciones maternas (O00-O99) | 86,36 | 78,29 | 89,80 | 92,00 | 95,65 | 93,68 | 96,26 | 96,26 | 97,17 | 0,91 |
| P96) | Condiciones maternas (000-099) Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) | 13,64 | 21,71 | 10,20 | 8,00 | 4,35 | 6,32 | 3,74 | 3,74 | 2,83 | -0,91 |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00- | Neoplasias malignas (C00-C97) | 1,94 | 0,34 | 0,33 | 0.61 | 0.54 | 1.28 | 1,04 | 1,27 | 1,53 | 0.26 |
| D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, | Otras neoplasias (D00-D48) | 2,48 | 0,34 | 0,53 | 0,56 | 0,34 | 0,75 | 0,94 | 0,95 | 1,67 | 0,26 |
| E10-E16, E20-E34, | Diabetes mellitus (E10-E14) | 2,70 | 2.15 | 1.59 | 1.24 | 1.74 | 2,20 | 2,15 | 1,52 | 2,67 | 1,16 |
| E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00- I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 4,00 | 3,76 | 2,39 | 2,67 | 5,15 | 5,78 | 6,65 | 5,84 | 4,63 | -1,21 |
| | Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) | 6,16 | 6,87 | 5,73 | 5,11 | 5,01 | 6,95 | 7,26 | 7,88 | 10,36 | 2,48 |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00- H61, H68-H93) | 5,08 | 5,41 | 3,93 | 3,68 | 4,36 | 5,02 | 4,53 | 5,38 | 7,40 | 2,01 |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 14,58 | 32,74 | 17,27 | 21,16 | 30,40 | 32,12 | 31,22 | 29,56 | 27,01 | -2,55 |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 3,35 | 3,88 | 2,59 | 2,75 | 3,22 | 3,33 | 3,56 | 4,16 | 4,51 | 0,35 |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 8,96 | 5,99 | 6,67 | 6,78 | 6,16 | 6,17 | 5,93 | 6,99 | 5,69 | -1,30 |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 11,34 | 7,72 | 8,56 | 7,92 | 8,73 | 10,22 | 11,62 | 10,27 | 12,61 | 2,34 |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 5,08 | 4,61 | 5,11 | 5,21 | 4,96 | 3,83 | 4,65 | 4,41 | 3,49 | -0,93 |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) | 13,82 | 12,74 | 12,81 | 11,27 | 11,93 | 10,57 | 9,97 | 9,70 | 10,59 | 0,89 |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 0,76 | 1,23 | 0,11 | 0,60 | 1,30 | 0,60 | 0,52 | 0,58 | 1,12 | 0,54 |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 19,76 | 12,27 | 32,37 | 30,42 | 15,99 | 11,19 | 9,97 | 11,46 | 6,72 | -4,74 |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 9,15 | 4,89 | 3,59 | 4,76 | 8,38 | 10,33 | 7,15 | 6,26 | 4,53 | -1,73 |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,21 | 0,74 | 0,29 | 0,45 | 0,09 | 6,87 | 6,78 |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,37 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) | 89,44 | 95,11 | 93,30 | 94,83 | 90,51 | 89,24 | 92,28 | 93,65 | 88,60 | -5,05 |
| Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

2.2.3 Morbilidad de Eventos de alto Costo

Se observa que la incidencia de VIH notificada es la más alta en los indicadores del municipio de El Dovio, pero aun así fluctúa con los indicadores del departamento.

En el periodo comprendido entre el 2006 y 2013, no se presentó morbilidad por ninguna de las incidencias, los casos presentaron fueron en el año 2014, entre los años 2015 y 2017 no se presentaron casos de morbilidad.

Tabla 81. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Municipio El Dovio, valle del Cauca 2006 – 2017.

| | | | | | | | Con | npor | tami | ento |) | | | |
|---|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Evento | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (Año 2017) | 0,00 | 0,00 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. (Año 2014) | 0,00 | 0,00 | - | - | | | | | | - | - | - | - | - |
| Tasa de incidencia de VIH notificada. (Año 2014) | 14,11 | 9,48 | - | - | | | | | - | - | 7 | 7 | - | - |
| Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años). (Año 2017) | 0,77 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años). (Año 2017) | 5,07 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: Sispro. Cuenta de alto costo y Sivigila

Tanto la prevalencia de diabetes mellitus como de hipertensión arterial para el año 2017 son menores en El Dovio que en el departamento.

2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores

Tabla 82. Semaforización eventos Precursores del Municipio El Dovio, valle del Cauca 2010 – 2017.

| | ., | | | | | (| Com | por | tami | ento |) | | | |
|---|--------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Evento | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 2006 | 2002 | 8002 | 6007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Prevalencia de diabetes mellitus (Año 2017) | 3,50 | 0,00 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ~ | 1 | 1 | - |
| Prevalencia de hipertensión arterial (Año 2017) | 10,40 | 0,00 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ~ | 7 | 1 | - |

Fuente: SISPRO-MS

En el municipio de El Dovio en ninguno de los indicadores presenta valores estadísticamente más elevados que los indicadores que presenta el Departamento.

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Tabla 83. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Dovio, 2006- 2017.

| | | | Comportamiento | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| Causa de muerte | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Causas externas | | | | | | | | | | | | | | |
| Accidentes biológicos | | | | | | | | | | | | | | |
| Accidente ofídico | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Violencia | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos | 0,00 | 0,00 | _ | - | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | _ |
| Trasmisibles | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmunoprevenibles | | | | | | | | | | | | | | |
| Varicela | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - |
| Transmisión aérea y contacto directo | | | | | | | | | | | | | | |
| Infección Respiratoria Aguda | 0,82 | 0,00 | - | - | - | 7 | > | 7 | > | 7 | 7 | 7 | / | 7 |
| Tuberculosis pulmonar | 7,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis extrapulmonar | 4,96 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | \ | - | - | - |
| Transmisión sexual y sanguínea | | | | | | | | | | | | | | |
| Dengue | 0,15 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dengue grave | 17,33 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malaria | 0,12 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malaria: falciparum | 0,05 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasas de incidencia PDSP | , | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de dengue clásico | 99,39 | 20,09 | | | | | | | | | | | | |
| según municipio de ocurrencia | 00,00 | 20,00 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
| Tasa de incidencia de dengue grave | 0,46 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| según municipio de ocurrencia | , | , | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de incidencia de leptospirosis | 3,74 | 0,00 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de incidencia de sífilis congénita | 68,96 | 0,00 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - |

Fuente: SISPRO - MS

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2018

Discapacidad Permanente

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos.

Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, acumulado a septiembre 30 de 2018. En El Dovio se han identificado 579 personas en situación de discapacidad, siendo la discapacidad del sistema nervioso más frecuente (53,37%), le sigue la discapacidad del movimiento del cuerpo manos, brazos, piernas (44,39%).

Tabla 84. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Dovio (Valle del Cauca). Acumulado a Septiembre 30 de 2018.

| Tipo de discapacidad | Personas | Proporción** |
|---|----------|--------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas | 257 | 44,39 |
| El sistema nervioso | 309 | 53,37 |
| Los ojos | 252 | 43,52 |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas | 228 | 39,38 |
| Los oídos | 111 | 19,17 |
| La voz y el habla | 104 | 17,96 |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas | 85 | 14,68 |
| El sistema genital y reproductivo | 40 | 6,91 |
| La piel | 15 | 2,59 |
| Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) | 9 | 1,55 |
| Ninguna | 0 | 0,00 |
| Total | 579 | · |

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Discapacidad Mujeres

Encontramos 303 casos de mujeres en situación de discapacidad, siendo las que se encuentran en los rangos de 80 y más años en su gran mayoría (77).

Tabla 85. Distribución de las alteraciones permanentes por Grupos de edad para mujeres, acumulado a septiembre 30 de 2018. Municipio de El Dovio.

| | Año |
|------------------|---------|
| Grupo de edad | 2018 |
| caaa | Mujeres |
| Total | 303 |
| 0-4 | 1 |
| 5-9 | 4 |
| 10-14 | 6 |
| 15-19 | 15 |
| 20-24 | 9 |
| 25-29 | 6 |
| 30-34 | 8 |
| 35-39 | 8 |
| 40-44 | 13 |

| 45-49 | 17 |
|----------|----|
| 50-54 | 20 |
| 55-59 | 20 |
| 60-64 | 22 |
| 65-69 | 30 |
| 70-74 | 27 |
| 75-79 | 19 |
| 80 Y MÁS | 77 |

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Discapacidad Hombres

En El Dovio se identificaron un total de 271 casos de personas del sexo masculino con alguna discapacidad permanente, siendo los hombres en el rango de los 80 y más años.

Tabla 86. Distribución de las alteraciones permanentes por Grupos de edad para hombres, acumulado a septiembre 30 de 2017. Municipio de El Dovio.

| | Año |
|------------------|---------|
| Grupo de edad | 2018 |
| ouuu | Hombres |
| Total | 271 |
| 0-4 | 1 |
| 5-9 | 7 |
| 10-14 | 19 |
| 15-19 | 17 |
| 20-24 | 11 |
| 25-29 | 9 |
| 30-34 | 12 |
| 35-39 | 10 |
| 40-44 | 8 |
| 45-49 | 10 |
| 50-54 | 17 |
| 55-59 | 10 |
| 60-64 | 21 |
| 65-69 | 15 |
| 70-74 | 16 |
| 75-79 | 17 |
| 80 Y MÁS | 70 |

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.




Figura 48. Pirámide de la población en condición de discapacidad

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.7 Identificación de prioridades Principales en la Morbilidad

Tabla 87. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida y eventos de notificación obligatoria Municipio de El Dovio.

| Morbilidad | Prioridad | Valor del indicador EL DOVIO | Valor del indicador VALLE DEL CAUCA | Tendencia | Grupos de Riesgo (MIAS) |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| | Enfermedades no transmisibles en Primera Infancia (Año 2017) | 40,71% | 42,22% | Fluctuante | 001 |
| | Lesiones en Adolescencia (Año 2017) | 23,86% | 9,97% | Aumento | 012 |
| General por grandes causas | Lesiones en Infancia (Año 2017) | 15,73% | 7,39% | Aumento | 012 |
| | Lesiones en la Juventud (Año 2017) | 15,15% | 10,05% | Aumento | 012 |
| | Lesiones: Traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias (Año 2017) | 88,60% | 93,50% | Disminución | 012 |
| | Condiciones Materno Perinatales: Condiciones Maternas (Año 2017) | 97,17% | 92,17% | Aumento | 008 |
| Específica por Subcausas o subgrupos | Transmisibles y nutricionales: Infecciones Respiratorias (Año 2017) | 53,92% | 45,30% | Aumento | 009 |
| subgrupos | No transmisibles: Enfermedades Cardiovasculares (Año 2017) | 27,01% | 20,76% | Aumento | 001 |
| | No transmisibles: Enfermedades Musco-Esqueléticas (Año 2017) | 10,59% | 12,01% | Fluctuante | 001 |
| | Neoplasias: Maglinas (Año 2017) | 1,53% | 2,87% | Fluctuante | 007 |
| Alto Costo | Tasa de Incidencia de VIH Notificada (Año 2014) | 9,48% | 14,11% | Disminución | 009 |
| | El sistema nervioso (30 Septiembre 2018) | 53,37% | 45,18% | Aumento | 000 |
| Discapacidad | El movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (30 Septiembre 2018) | 44,39% | 49,48% | Disminución | 000 |
| | Los ojos (30 Septiembre 2018) | 43,52% | 41,43% | Fluctuante | 000 |

Fuente: SISPRO- Ministerio de Salud

Conclusiones

Entre las grandes causas de morbilidad, se observa que Aumento las Lesiones con gran incidencia en la etapa de Adolescencia para el año 2017, de igual manera observamos una estabilidad de las Enfermedades no trasmisibles en Primera Infancia en comparación con el Departamento para el año 2017.

Para los casos de Morbilidad especifica por subgrupo el traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias tienen una leve disminución para el año 2017 en comparación con los porcentajes del Departamento, para las Condiciones Maternas se observa un aumento, al igual que las Infecciones Respiratorias, en las Enfermedades Cardiovasculares el Municipio se encuentre por encima de los porcentajes del Departamento para el año 2017 y las Neoplasias Malignas que presenta un porcentaje fluctuante o estable.

Para los casos de Alto Costo observamos que los porcentajes de UVIH notificada Disminuyeron año 2104, en comparación con el Departamento.

En cuanto a las principales condiciones de Discapacidad en primer lugar se encuentra la alteración del Sistema Nervioso con aumento para el porcentaje del Municipio en comparación con el Departamento Corte 30 de Septiembre 2018, seguido de la alteración permanente para el Movimiento del cuerpo, Manos, Brazos y Piernas en segundo lugar (Disminución), y en tercer lugar alteraciones de los Ojos (Fluctuante).

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades -DY sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

Los indicadores que muestran al municipio de El Dovio con valores estadísticamente en peor situación que el Valle del Cauca, teniendo en mayor proporción el Índice de la calidad del agua para el consumo humano, seguido del porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, terminando con el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, entre los más primordiales temas a tener presentes, estas situaciones se desarrollan debido a que el Municipio solo cuenta con una planta de tratamiento de agua en la parte urbana a cargo de ACUAVALLE, mientras en la zona rural no existe una cultura ni el Municipio cuenta con los recursos necesarios para atender todos los acueductos rurales, mientras tanto los habitantes de la zona rural consumen aguas de nacimientos sin un tratamiento adecuado, de igual manera se tiene dificultades tanto en la población rural como urbana debido a que no se tiene un tratamiento de aguas negras, no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, por tanto el Municipio diariamente hace esfuerzos en buscar satisfacer estas necesidades, no obstante es indispensable articular los esfuerzos con las demás entidades Locales, Departamentales y Nacionales que de una u otra manera se encuentran inmersos en la problema y así buscar solucionar estas problemáticas.

En el municipio no presenta cobertura de telefonía fija, ya que este servicio fue suspendido por parte de la empresa prestadora de ese entonces -TELECOM. En el municipio de El Dovio solo se recibe el servicio de telefonía móvil (hasta la fecha predomina Claro-antiguo Comcel-Movistar y Tigo).

Tabla 88. Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida del Municipio de El Dovio 2015.

| Determinantes intermediarios de la salud | VALLE DEL CAUCA | EL DOVO |
|--|-----------------|---------|
| Cobertura de servicios de electricidad (2015) | 99,09 | 88,69 |
| Cobertura de acueducto (2005) | 86,3 | 82,73 |
| Cobertura de alcantarillado (2005) | 77,4 | 73,29 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) (2017) | 17 | 37,26 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005) | 6,7 | 18,71 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) | 5,4 | 11,43 |

Fuente: Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

El municipio de El Dovio, Valle no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, es por ello que el porcentaje para este indicador arroja un resultado mucho mayor en comparación al Departamento del Valle. El porcentaje de cobertura de telefonía solo incluye el servicio móvil, ya que el municipio no cuenta con el servicio de telefonía fija desde el año 2013. Para este indicador, el 100% de la zona urbana cuenta con cobertura, mientras que para el área rural solo alcanza el 30%.

El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada corresponde a la zona rural del municipio, ya que ninguno de los hogares cuenta con acueductos con sistema de potabilización de aguas.

Por tal razón se considera necesario buscar estrategias comunes entre los entes en cuestión como Salud, Planeación, la Administración Municipal, esto tanto Local, Regional y Nacional, para llevar a cabo un proceso que beneficie la población.

Tabla 89. Desagregación según urbano-Rural

| Determinantes intermediarios de la salud | Cabecera | Resto |
|---|----------|-------|
| Cobertura de servicios de electricidad (Año 2015) | 100 | 76,70 |
| Cobertura de acueducto (Año 2016) | 98,74 | 58,69 |
| Cobertura de alcantarillado (Año 2016) | 99,2 | 34,46 |

Fuente: Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

Disponibilidad de alimentos

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El cálculo de este indicador nos muestra que para el año 2016 el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de El Dovio Valle es de (15,87%); comparativamente con el departamento (8,61%) se encuentra superior a la cifra del Departamento, se observa una tendencia fluctuante entre los once años de análisis donde hay un leve aumento entre los años 2006 a 2009, con disminución entre los años 2010 y 2011 en comparación al año 2009, nuevamente un leve aumento en el año 2012 y 2013, con disminución en los años 2014 y 2015, terminando con el último año de comparación 2016 con tendencia a la alta y un porcentaje elevado comparado en el del Departamento, situación que hace que se deban priorizar, vinculando las entidades Locales, Regionales y Nacionales inmersas en el tema.

Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud – seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2006-2016.

| | | | | | | | Con | nportan | niento | | | | |
|---|--------------------|----------|------|------|------|------|------|---------|--------|------|------|------|------|
| Determinantes intermediarios de la salud | VALLE DEL CAUCA | FI DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2016) | 8,61 | 15,87 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | > | 7 | 7 | ٧ | > | 7 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Condiciones de Trabajo

Incidencia de accidentalidad en el trabajo. Para el año 2013 no se reportaron datos de incidencia de accidentalidad en el trabajo para en el Municipio de El Dovio.

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. Para el año 2013 no se reportaron datos de incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo para en el Municipio de El Dovio.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Para el análisis de los indicadores de los factores psicológicos y culturales, se utilizó tasas, prevalencias y porcentajes. Sus resultados se mencionan a continuación.

Tasa de Violencia intrafamiliar

En El Dovio la tasa que presentó sobre incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2017 fue de 72,06, entre tanto la tasa del Valle del Cauca fue 111,34.

Tasa de Violencia contra la mujer

En El Dovio la tasa de incidencia de violencia contra la mujer para el año 2017 fue de 47,81 dicha tasa es menor que la tasa del Valle del Cauca la cual fue 137,01.

Tabla 91. Determinantes intermedios de la salud – factores psicológicos y culturales del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2006-2017.

| Determinantes intermedios de la | VALLE | EL | | | | C | om | por | tam | ient | 0 | | | |
|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| salud | DEL CAUCA | DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2017) | 111,34 | 72,06 | | | | | | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | - |
| Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2017) | 137,01 | 47,81 | | | | | | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Sistema Sanitario

La cobertura de los biológicos para nacidos vivos del Municipio de El Dovio se encuentra en estado de alerta al realizar el análisis anterior, por lo que es importante la intervención y generación de estrategias que mejoren la cobertura. Preocupa la cobertura de BCG la cual solo alcanza el 63,25%, comparado con el 87,65 del Departamento.

Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud – sistema sanitario del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2005-2017.

| VALLE Comportamiento | | | | | | | mpo | orta | mie | nto | | | | |
|---|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Determinantes intermedios de la salud | DEL CAUCA | EL DOVIO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los | | | | | | | | | | | | | | |
| servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005) | 12,67 | 17,81 | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005) | 5,45 | 4,72 | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2017) | 90,33 | 100,00 | | | | | | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2017) | 87,65 | 63,25 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017) | 92,36 | 86,14 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | > | 7 | 7 | 7 | - |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017) | 93,02 | 86,14 | - | - | - | - | 7 | 7 | / | / | 7 | 7 | 7 | - |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2017) | 94,26 | 95,48 | - | - | - | - | 7 | 7 | / | 7 | ~ | 7 | 7 | - |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2016) | 91,52 | 80,16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2016) | 99,30 | 88,14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2016) | 99,40 | 88,98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |

Servicios habilitados IPS - municipio de El Dovio Valle.

El Municipio de El Dovio cuenta solo con una IPS Hospital Santa Lucia, la cual se encargada de atender a toda la población, prestando los servicios de Consulta, Urgencias, Odontología y demás temas de la salud.

Tabla 93. Servicios habilitados de las instituciones Prestadoras de Salud por el Municipio de El Dovio, valle del cauca 2017

| Grupo Servicio | Indicador | 2017 |
|-------------------|---|------|
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje | 1 |
| APOYO DIAGNÓSTICO | Y Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico | 1 |
| COMPLEMENTACIÓN | Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas | 1 |
| TERAPÉUTICA | Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas | 1 |

Alcaldía Municipal El Dovio Valle Soluciones para el progreso Municipal

| Grupo Servicio | Indicador | 2017 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general | 1 |
| CONSULTA EXTERNA | Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos | 1 |
| INTERNACION | Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia | 1 |
| OTROS SERVICIOS | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo | 1 |
| PROCESOS | Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la | 1 |
| | agudeza visual | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del | 1 |
| | crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del | 1 |
| | desarrollo del joven (de 10 a 29 años) | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del | 1 |
| | embarazo | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto | 1 |
| | (mayor a 45 años) | |
| PROTECCION ESPECIFICA | Y Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino | 1 |
| DETECCION TEMPRANA | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién | 1 |
| | nacido | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en | 1 |
| | planificación familiar hombres y mujeres | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en | 1 |
| | salud bucal | |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación | 1 |
| TRANSPORTE ASISTENCIAL | Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico | 1 |
| URGENCIAS | Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias | 1 |
| Franks Danadamanta Administrati | Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo | de Feteriketere |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otros indicadores del sistema sanitario - municipio de El Dovio Valle.

Tabla 94. Otros indicadores del sistema sanitario en el Municipio de El Dovio, valle del cauca 2017.

| Indicador | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|
| Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes | 14,99 | 15,13 |
| Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes | 0,00 | 0,00 |
| Razón de ambulancias por 1.000 habitantes | 14,99 | 15,13 |
| Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes | 15,35 | 15,49 |
| Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes | 0,00 | 0,00 |
| Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes | 0,00 | 0,00 |
| Razón de camas por 1.000 habitantes | 35,81 | 36,15 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental. SISPRO.

2.2.8.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Otros indicadores de ingreso - 2011.

En el municipio de El Dovio para el año 2011 el 20,56% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. Esta proporción es mayor en la población rural, con cerca de 28,36%. La población bajo la línea de pobreza en la zona urbana es del 52,4%, mientras en la zona rural alcanza un 75,7%. La población que vive en miseria en la zona urbana es del 2,12%, mientras en la zona rural es del 5,6%. Por último, la población que vive en hacinamiento en la zona urbana es del 3,89% y en la zona rural es del 4,15%.

Tabla 95. Otros indicadores de ingreso, cabecera- Municipio de El Dovio, valle del cauca DANE 2008-2011.

| INDICADORES DE INGRESO | 2011 |
|---|--------|
| Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas. | 20,56% |
| Proporción de población bajo la línea de pobreza | 52,40% |
| Proporción de población en miseria | 2,12% |
| Proporción de población en hacinamiento | 3,89% |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Tabla 96. Otros indicadores de ingreso, Rural- Municipio de El Dovio, valle del cauca DANE 2005-2011.

| INDICADORES DE INGRESO | 2011 | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|--|
| Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas. | 28,36% | | | | | |
| Proporción de población bajo la línea de pobreza | 75,70% | | | | | |
| Proporción de población en miseria | 5,60% | | | | | |
| Proporción de población en hacinamiento | 4,15% | | | | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cobertura Bruta de Educación

La tasa de cobertura bruta de educación primaria en el municipio de El Dovio Valle para el año 2017 alcanza un (117,40%) superior a la tasa del Departamento; la tasa de cobertura bruta de educación secundaria presentó aumento evidenciándose que El Dovio se encuentra levemente por encima del Valle de Cauca. La Tasa de Cobertura Bruta de Educación Categoría Media es menor para el Municipio en comparación con el Valle del Cauca.

El porcentaje estadístico de analfabetismo para el municipio de El Dovio Valle, es de (17,81%) la cual se acerca mucho al porcentaje del Departamento del Valle del Cauca (12,10%), mientras la Tasa de Cobertura Bruta de Educación Categoría Media 2017 para el municipio de El Dovio fue de (73,21%) porcentaje que también se acerca al dato del Departamento el cual fue (77,70%), la priorización de estos dos temas son esenciales para evitar el analfabetismo y la deserción escolar en el Municipio.

Tabla 97. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2005-2017.

| | VALLE DEL | | Comportamiento | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Eventos de Notificación Obligatoria | CAUCA | EL DOVIO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005) | 12,10 | 17,81 | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2017) | 93,70 | 117,40 | - | - | - | 7 | 7 | V | 7 | V | ¥ | V | 7 | V | V | V | K |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2017) | 100,98 | 122,94 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | V | V | 7 | 7 | 7 | V | V | 7 | 7 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2017) | 77,70 | 73,21 | - | - | - | 7 | 'n | 'n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

Porcentaje de Hogares con Empleo Informal

El porcentaje de empleo informal en el municipio de El Dovio es del 98,25%, y el porcentaje de trabajo infantil es de 5,57%.

3 CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizó la priorización en salud, para esto se realiza un listado de los principales problemas de salud.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

En la siguiente tabla se describen los problemas identificados en el primer y segundo capítulo. Se formulan como una situación negativa que debe ser modificada.

Tabla 98. Priorización de los problemas de salud del Municipio de El Dovio, valle del cauca 2016.

| Dimensión Plan Decenal | Prioridad | Grupos de Riesgo (MIAS) | |
|---|---|-------------------------------|--|
| | Determinante: Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (Año 2017) | 000 | |
| | Determinante: Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (Año 2005) | 000 | |
| 1.Salud Ambiental | Determinante: Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (Año 2017) | 000 | |
| 110414471110101144 | Determinante: Baja Cobertura del Servicio Electrico (Año 2015) | 000 | |
| | Determinante: Baja Cobertura del Servicio de Acueducto (Año 2016) | 000 | |
| | Determinante: Baja Cobertura del Servicio de Alcantarillado (Año 2016) | 000 | |
| | Mortalidad: Enfermedades del sistema circulatorio por 100.000 hab. (Año 2016) | 001 | |
| | Mortalidad: Enfermedades cerebrovasculares por 100.000 hab. (Año 2016) | 001 | |
| 2. Vida saludable y | Mortalidad: Enfermedades del sistema circulatorio: T asa ajustada de enf. Isquémicas del corazón (Año 2016) | 001 | |
| condiciones no | Morbilidad: Neoplasias malignas (Año 2017) | 007 | |
| transmisibles | T asa de Mortalidad Neoplasis por 100.000 (Año 2016) | 007 | |
| | Mortalidad: Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (Año 2016) | 007 | |
| | Mortalidad: Tasa de Mortalidad Todas las Demas Causas (Año 2016) | 000 | |
| | Morbilidad: Lesiones Traumatismos envenenamientos y algunas otras consecuencias de | | |
| 3. Convivencia social y | causa externa (Año 2017) | 012 | |
| salud mental | Mortalidad: Tasa ajustada de accidentes de tránsito por 100.000 hombres (Año 2016) | 012 | |
| | Mortalidad: Tasa ajustada de Homicidios por 100.000 hombres (Año 2016) | 012 | |
| 4.Seguridad alimentaria y nutricional | Determinante: Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEW-DANE 2016) | 008 | |
| | Tasa de incidencia de VIH notificada (2014)(Cuenta Alto Costo) | 009 | |
| 5. Sexualidad, derechos | Neoplasias:Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de la próstata (Año 2016) | 007 | |
| sexuales y reproductivos | Neoplasias: Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno del cuello del útero (Año 2016) | 007 | |
| , | Tasa de mortalidad neonatal en área rural Cabecera (Año 2016) | 800 | |
| 6. Vida saludable y | Mortalidad por Enfermedades Cronicas de las vias Respiratorias Inferiores (Año 2016) | 009 | |
| enfermedades transmisibles | Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas por 100.000 menores de 5 Años (Año 2016) | 009 | |
| 7. Salud pública en | Alto Riesgo de avalanchas y derrumbes por estar ubicado en medio de varias fuentes hidricas y | | |
| emergencias y desastres | por ser zona montañosa. | SIN DATO | |
| 8. Salud y Ambito laboral | Alto porcentaje de hogares con empleo informal | 011 | |
| 9.Gestion diferencial en | Discapacidad: El sistema Nervioso (Año 2018) | 000 | |
| poblaciones vulnerables | Discapacidad: Los Ojos (Año 2018) | 000 | |
| | Morbilidad por Condiciones mal clasificadas en Infancia (Año 2016) | SIN DATO | |
| 10. Fortalecimiento de la | Morbilidad por Condiciones mal clasificadas en Primera Infancia (Año 2016) | SIN DATO | |
| autoridad sanitaria | Determinante: Bajo porcentaje de cobertura administrativas de vacunación <u>BCG</u> en nacidos vivos (Año 2017) | 009 | |